

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
ОДЕСЬКИ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

**МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ**

**ДО СРС ТА ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З  
ДИСЦИПЛІНИ «ХІМІЯ З ОСНОВАМИ БІОГЕОХІМІЇ»  
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІІІ КУРСУ ЗАОЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ**

Напрям підготовки –6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

*Спеціалізація – агроекологія  
(інтегрований план підготовки)*

Одеса 2013

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

**МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ**

**ДО СРС ТА ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З  
ДИСЦИПЛІНИ «ХІМІЯ З ОСНОВАМИ БІОГЕОХІМІЇ»  
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІІІ КУРСУ ЗАОЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ**

Напрям підготовки –6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

*Спеціалізація – агроекологія  
(інтегрований план підготовки)*

«Затверджено»  
на засіданні робочої групи  
методичної ради  
«Заочна та післядипломна освіта»

Одеса 2013

Збірник методичних вказівок до СРС та виконання контрольної роботи з дисципліни «Хімія з основами біогеохімії» (інтегрований план підготовки) для студентів III курсу заочного факультету напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».

Укладачі: Горліченко М.Г., доц., к.п.н., Шевченко С.В., ст. викл.,  
Одеса, ОДЕКУ, 2013. - 103 с., укр. мова.

## ЗМІСТ

<b>I Вступна частина.....</b>	<b>5</b>
1.1 Складові навчальної дисципліни. Місце і значення навчальної дисципліни.....	5
1.2 Рекомендована література.....	10
1.3 Порядок виконання і оформлення контрольної роботи.....	11
1.4 Організація поточного та підсумкового контролю рівня знань студентів.....	12
1.5 Таблиця варіантів контрольної роботи.....	16
<b>II Методичні вказівки до СРС при виконанні контрольної роботи .....</b>	<b>17</b>
<b>Вказівки до рішення контрольних завдань.....</b>	<b>20</b>
<b>Модуль 1 (теоретичний); модулі 2 і 3 (практичні).....</b>	<b>20</b>
Теоретичні положення, приклади розв'язання завдань.....	20
Розділ 1 ОСНОВНІ ЗАКОНИ ХІМІЇ.....	20
1.1 Основні закони і хімічні поняття .....	20
1.2 Основні закони хімії.....	21
1.3 Закони ідеальних газів.....	22
1.4 Приклади розв'язання завдань.....	22
Розділ 2 ХІМІЧНА БУДОВА РЕЧОВИНИ.....	26
2.1 Будова атома.....	26
2.1.1 Квантові числа, їх фізичний зміст.....	26
2.1.2 Електронні формули атомів.....	27
2.1.3 Електронні формули атомів у збудженному стані.....	27
2.1.4 Електронні формули йонів.....	28
2.1.5 Формульовання періодичного закону Д.І. Менделєєва.....	29
2.1.6 Періодична зміна властивостей хімічних елементів.....	29
2.1.7 Приклади розв'язання завдань .....	29
2.2 Хімічний зв'язок.....	31
2.2.1 Виникнення хімічного зв'язку .....	31
2.2.2 Ковалентний зв'язок .....	32
2.2.3 Метод валентних зв'язків .....	32
2.2.4 Гібридизація орбіталей та просторова конфігурація молекул.....	32
2.2.5 Координаційна теорія Вернера і склад комплексних сполук.....	34
2.2.6 Приклади розв'язання завдань.....	36
Розділ 3 ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ПЕРЕБІГУ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ.....	39
3.1 Термохімія.....	40
3.1.1 Енергетика хімічних процесів .....	40
3.1.2 Теплові ефекти реакцій.....	40

3.1.3 Внутрішня енергія.....	40
3.1.4 Термохімічні закони.....	40
3.1.5 Приклади розв'язання завдань.....	40
3.2 Хімічна кінетика. Швидкість хімічних реакцій.....	43
3.2.1 Закон діючих мас .....	43
3.2.2 Хімічна рівновага.....	43
3.2.3 Зміщення хімічної рівноваги. Принцип Ле-Шательє.....	43
3.2.4 Приклади розв'язання завдань.....	43
<b>Розділ 4 РОЗЧИНИ.....</b>	<b>44</b>
4.1 Способи визначення складу розчинів.....	45
4.2 Колігативні властивості розведених розчинів.....	45
4.3 Водні розчини електролітів.....	45
4.3.1 Сильні електроліти.....	45
4.3.2 Йонний добуток води Водневий показник.....	45
4.3.3 Гідроліз солей.....	45
4.4 Приклади розв'язання завдань.....	45
4.5 Завдання до виконання контрольної роботи з модуля 1 (теоретичного).....	50
4.6 Завдання до виконання контрольної роботи з модуля 2 (практичного).....	53
4.7 Завдання до виконання контрольної роботи з модуля 3 (практичного).....	55
<b>Модуль 4(теоретичний); модуль 5 (практичний).....</b>	<b>59</b>
Теоретична частина та приклади розв'язання завдань.....	59
<b>Розділ 5 ОСНОВИ ЕЛЕКТРОХІМІЇ.....</b>	<b>59</b>
5.1 Окисно-відновні реакції.....	60
5.2 Електродний потенціал.....	63
5.3 Гальванічний елемент.....	66
5.4 Корозія металів.....	68
5.5 Електроліз розчинів і розплавів.....	71
5.6 Приклади розв'язання завдань .....	73
<b>Розділ 6 ДИСПЕРСНО–КОЛОЇДНІ СИСТЕМИ.....</b>	<b>76</b>
6.1 Загальні положення.....	77
6.2 Властивості колоїдних систем.....	81
6.3 Приклади розв'язання завдань.....	84
<b>Розділ 7 ОСНОВИ БІОГЕОХІМІЇ.....</b>	<b>87</b>
7.1 Теоретичні положення.....	87
7.2 Завдання до виконання контрольної роботи з модуля 4 (теоретичного).....	90
7.3 Завдання до виконання контрольної роботи з модуля 5 (практичного).....	94
Додатки.....	99

## I Вступна частина

### 1.1 Складові навчальної дисципліни

#### Місце і значення навчальної дисципліни

Дисципліна «Хімія з основами біогеохімії» належить до циклу природничо-наукової підготовки, напрям підготовки – 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», спеціалізація – «Агроекологія», освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр.

«Хімія з основами біогеохімії» є нормативною дисципліною (інтегрований план підготовки) та служить базою для подальшого більш поглиблена вивчення інших фахових дисциплін.

Читання даної дисципліни базується на попередньому вивчені студентами «Хімії», «Біології», «Математики», «Фізики», знання з яких одержані за програмою середньої школи та технікуму.

Отримані знання та вміння надалі будуть використовуватися при вивчені наступних навчальних дисциплін: «Екологія міських систем та ландшафтна екологія», «Екологія особини», «Екологія людини», «Екологія рослин», «Нормування антропогенного навантаження на природне середовище», «Грунтознавство», «Гідрологія».

Загальний обсяг навчального часу визначається освітньо-професійною програмою бакалавра та складається з: 10 год. – лекції, 4 год. – лабораторні заняття, 4 год. – практичні заняття, 101 год. – самостійна робота студентів (СРС), іспит; всього – 119 год. Контроль поточних знань здійснюється на основі усного опитування на лабораторних та практичних заняттях, складання протоколів лабораторних робіт, виконанні контрольної роботи, що включає два теоретичних та три практичних модулі. У кінці 6-го семестру – іспит.

**Мета дисципліни** – формування у студентів агроекологів повного уявлення про теоретичні основи загальної, колоїдної хімії та біогеохімії; сформувати у студентів науковий світогляд на основі сучасних знань про будову та властивості хімічних сполук, закономірності перебігу хімічних та електрохімічних процесів, хімічні явища у дисперсних системах, забезпечення основ екологічних знань, які необхідні для збереження природного середовища, вироблення раціональної та безпечної поведінки в усіх галузях виробництва, культури, науки та в повсякденному житті; формування сучасного світогляду – розглядати життя із врахуванням біосфери, як єдиної системи живої речовини та мінеральних сполук.

Практичне значення дисципліни складається у тому, що вирішення будь-якої екологічної, гідрометеорологічної проблеми засновано на розумінні закономірностей процесів у довкіллі, вмінні їх аналізувати і прогнозувати.

**Базові знання та вміння, які отримують студенти.**

Після вивчення дисципліни студент повинен знати:

- теоретичні основи хімії – фізичні та хімічні властивості речовин;
- будову та властивості хімічних сполук;
- енергетику хімічних процесів, закони перебігу хімічних реакцій;
- хімічні властивості розчинів та закони розчинення різних речовин;
- електрохімічні процеси;
- властивості колоїдних розчинів;
- процеси міграції хімічних елементів, їх ізотопів та сполук;
- особливу роль Карбону в органічному світі;
- хімічний склад живих організмів та роль хімічних елементів у розвитку організмів;
- вплив життя на історію земних хімічних елементів, їх міграцію, накопичення, участь в геохімічних процесах, зони гіпергенезу та ґрунтоутворення;
- вплив технічного прогресу на процеси в біосфері;
- будову біосфери, її структурних одиниць, властивості та енергетику;
- процеси міграції хімічних елементів, їх ізотопів та сполук;
- біогеохімічні цикли біогенних елементів, окислювально-відновні властивості сполук біогенних елементів; O, N, C, P, H, S та їх участь у створенні геохімічних бар'єрів;
- В.І. Вернадський про «живу речовину» та її функції;
- основи біогеохімічного районування в формуванні біогеохімічних провінцій і прояві біогеохімічних аномалій.

**Навчально-методичне забезпечення** дисципліни здійснюється за допомогою підручників, навчальних посібників та методичних вказівок, які є в наявності в бібліотеці ОДЕКУ та на кафедрі хімії навколошнього середовища:

**Рекомендована література:** основна – 1, 2, 3; додаткова – 8, 9, 12, 13, 15.

Після вивчення дисципліни студент повинен вміти:

- розв'язувати розрахункові завдання із загальної та колоїдної хімії;
- класифікувати органічні та біологічно-активні речовини, застосовувати міжнародну номенклатуру IUPAC;
- вміти користуватися лабораторними приладами та фізико-хімічною апаратурою;
- застосовувати теоретичні знання з хімії для глибокого розуміння закономірностей розвитку навколошнього середовища.
- застосовувати правила техніки безпеки при виконанні хімічних дослідів.

**Навчально-методичне забезпечення дисципліни:** забезпечена наявністю на кафедрі хімії навколошнього середовища необхідними збірниками методичних вказівок з дисципліни «Хімія з основами біогеохімії».

В бібліотеці ОДЕКУ і на кафедрі є в наявності **рекомендована література**: основна – 1, 2,5; 7,11,12,; додаткова –13- 27.

**Мета методичних вказівок** – допомогти студентам заочного факультету в організації самостійної роботи студентів (СРС) та виконанні контрольної роботи при засвоєнні основних знань з хімії та біогеохімії; формування у студентів цілісного світогляду на основі сучасних знань, щодо уяви про хімічні процеси, які відбуваються в атмосфері, літосфері, біосфері, гідросфері, про хімічний склад природних речовин та розуміння хімічних процесів, що відбуваються з ними.

Невеликий обсяг аудиторних занять ставить питання інтенсифікації навчального процесу, організації самостійної роботи студентів заочного факультету, формування в них навичок роботи з літературою, довідково-графічними і практичними матеріалами, комп'ютерною технікою тощо.

Якість підготовки майбутніх спеціалістів залежить, на рівні з іншими складовими, від організації і методики самостійної роботи під час самостійного виконання контрольних робіт, що має особливе значення для ефективного процесу засвоєння знань. В збірнику методичних вказівок до організації самостійних занять та виконання контрольної роботи розглянуто найважливіші теоретичні питання і практичні завдання загальної, колоїдної хімії та біогеохімії, які є фундаментальною основою вивчення хімічних процесів навколошнього середовища та надані рекомендації з прикладами розв'язання типових задач.

Цей збірник методичних вказівок буде практичним посібником до СРС та виконання контрольної роботи із хімії та основ біогеохімії. В процесі проведення лабораторних робіт та під час аудиторних занять студенти повинні засвоїти великий обсяг фактичного матеріалу і виконати практичні завдання, які можуть бути використані під час виконання курсових і дипломних робіт та майбутньої роботи з обраної спеціальності.

До збірника введені контрольні запитання та завдання за програмою дисципліни «Хімія з основами біогеохімії» для державних університетів, що допоможе студентам заочного факультету більш глибоко засвоїти програмний теоретичний і практичний матеріал.

Дисципліна «Хімія з основами біогеохімії» повинна надати базові знання з фізичної хімії, біогеохімії, а також сформувати у студентів уявлення про нерозривну єдність і взаємозв'язок природи. Практична вагомість дисципліни складається з уміння застосовувати одержані знання та вміння у практичній роботі та вміння працювати із спеціалізованою літературою, яка описує хімічний та екологічний стан довкілля.

**Зміст розділів дисципліни «Хімія з основами біогеохімії» для студентів  
ІІІ курсу заочного факультету**

***Модуль 1 (теоретичний), модулі 2,3 (практичні)***

**Розділ 1. ОСНОВНІ ЗАКОНИ ХІМІЇ.**

1.1. Атомно-молекулярне вчення та закони хімії

1.2 Основні хімічні поняття

1.3 Приклади розв'язання завдань

1.4. Приклади розв'язання завдань

**Розділ 2. ХІМІЧНА БУДОВА РЕЧОВИНИ**

2.1. Електронна будова атома

2.1.1 Квантові числа, їх фізичний зміст

2.1.2 Електронні формули атомів

2.1.3 Електронні формули атомів у збудженному стані та йонів

2.1.4. Вплив електронної будови атомів елементів на їхні хімічні

властивості

2.2. Природа хімічного зв'язку.

2.2.1. Метод валентних зв'язків. Гібридизація орбіталей

2.2.2. Ковалентний зв'язок

2.2.3. Міжмолекулярні взаємодії

2.2.4. Координаційна теорія Вернера і склад комплексних сполук

2.2.5 Приклади розв'язання завдань

2.3. Завдання до виконання контрольної роботи

**Розділ 3. ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ПЕРЕБІGU ХІMІЧНИХ  
РЕАКЦІЙ**

3.1 Термохімія.

3.1.1 Енергетика хімічних процесів

3.1.2 Теплові ефекти реакцій

3.1.3 Внутрішня енергія

3.1.4 Термохімічні закони

3.1.5 Приклади розв'язання завдань

3.2 Хімічна кінетика. Швидкість хімічних реакцій

3.2.1 Закон діючих мас

3.2.2 Хімічна рівновага

3.2.3 Зміщення хімічної рівноваги. Принцип Ле-Шательє.

3.2.4 Приклади розв'язання завдань

3.3. Завдання до виконання контрольної роботи

**Розділ 4. РОЗЧИНИ**

4.1. Загальна характеристика розчинів

4.1.1. Концентрація розчинів.

4.1.2. Фізико-хімічні властивості розчинів неелектролітів. Осмос.

4.1.3. Розчинення газів. Закони Рауля і Генрі

4.2. Водні розчини електролітів

- 4.2.1 Сильні електроліти
- 4.2.2 Добуток розчинності
- 4.3. Електролітична дисоціація води. Гідроліз солей
  - 4.3.1. Йонний добуток води
  - 4.3.2. Гідроліз солей
- 4.4 Приклади розв'язання завдань

***Модуль 4 (теоретичний), модуль 5 (практичний)***

**Розділ 5. ОСНОВИ ЕЛЕКТРОХІМІЇ.**

- 5.1 Окисно-відновні реакції
- 5.2 Хімічні джерела електричної енергії
  - 5.1. Електродні потенціали. Ряд напруги металів. Рівняння Нернста
- 5.3. Корозія металів, як природний електрохімічний процес
  - 5.3.1. Види корозії
  - 5.3.2. Методи захисту металів від корозії
  - 5.3.3. Електроліз електролітів

**Розділ 6. ДИСПЕРСНО–КОЛОЇДНІ СИСТЕМИ**

- 6.1. Загальна характеристика дисперсних систем
  - 6.1.1. Сорбція та сорбційні процеси
  - 6.1.2. Поверхнево-активні та поверхнево-інактивні речовини
  - 6.1.3. Іонообмінна адсорбція, хроматографія
- 6.2. Електрокінетичні явища
  - 6.2.1. Стійкість та коагуляція колоїдних систем

**Розділ 7. ОСНОВИ БІОГЕОХІМІЇ**

- 7.1. Поняття про біогеохімію як науку
  - 7.1.1. Основні поняття, проблеми та термінологія
  - 7.1.2. Вчення В.І. Вернадського про біосферу
  - 7.1.3. Склад та фізико-хімічна характеристика біосфери
- 7.2. Жива речовина
  - 7.2.1. Поняття В.І. Вернадського та сучасний погляд на живу речовину
  - 7.2.2. Органічні речовини та їх трансформація
  - 7.2.3. Ґрунт та його внесок в розвиток біосфери
  - 7.2.4. Міграція речовин, її типи
  - 7.2.5. Біогеохімічні функції живої речовини
- 7.3. Фактори, що впливають на хімічний склад рослин
  - 7.3.1. Бар'єрні та безбар'єрні організми
  - 7.3.2. Біологічний кругообіг речовин, як форма розвитку планети
  - 7.3.3. Загальні закономірності біогеохімічного кругообігу речовин
  - 7.3.4. Ноосфера. Техногенна міграція елементів

## **1.2 Рекомендована література**

### *Основна:*

1. Глинка Н.Л. Общая химия: Учебн. пос. для вузов. – Л.: Химия, 1984. – 704с.
2. Орлов А.С., Безуглова О.С. Биогеохимия: Ученик для студ. вузов. – Ростов-на-Дону, Фенікс, 2000. – 310с.
3. Каданер Л.І. Фізична і колоїдна хімія, Київ: Вища школа, 1973. – 287с.
4. Вернадский В.И. Проблемы биогеохимии.- М.: Изд. АН СССР, 1980. – 320с.
5. Мітрясова О.П. Хімічні основи екології.- К.: Перун, 1999. – 192с.
6. Фелленберг Г. Загрязнение природной среды. Введение в экологическую химию: Пер. с нем.– М.: Мир, 1997. – 232с.
7. Перекалин В.В., Зонис С.А. Органическая химия. – М.: Просвещение, 1966. – 686с.
8. Вернадский В.И. Химическое строение биосфера Земли и ее окружения. /отв. ред. А.А. Ярошевский/, -М.: Наука, 1987. – 338с.
9. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера.- М.: Наука, 1989. – 258с.

### *Додаткова:*

10. Герасименко Г.І., Шепеліна С.І. Основні поняття і закони хімії Методичні вказівки – Одеса, ОДЕКУ, 2002. – 60с.
11. Герасименко Г.І., Хімія. Практичний курс. – Одеса, ОДЕКУ, 2009. – 304с.
12. Шевченко В.Ф., Шепеліна С.І Основи електрохімії. Збірник методичних вказівок до лабораторних робіт – Одеса, ОДЕКУ, 2003. – 81с.
13. Костік В.В., Ганін Е.В., Васильєва М.Г. Збірник методичних вказівок до лабораторних робіт «Розчини. Гідроліз солей» - Одеса, ОДЕКУ, 2003. – 34с.
14. Зінченко В.Ф., Федорова Г.В., Костік В.В., Шевченко В.Ф. Загальна, колоїдна і неорганічна хімія – Одеса, ТЕС, 2004. – 134с.
15. Ганін Е.В., Костік В.В., Шевченко В.Ф Збірник методичних вказівок до практичних занять з дисципліни «Загальна і колоїдна хімія» - Одеса, ОДЕКУ, 2004. – 113с.
16. Герасименко Г.І. Закономірності перебігу хімічних реакцій. Збірник методичних вказівок до практичних робіт – Одеса, ОДЕКУ, 2006. – 51с.
17. Герасименко Г.І. Водні розчини електролітів. Гідроліз солей. Збірник методичних вказівок до практичних та лабораторних робіт – Одеса, ОДЕКУ, 2006. – 75с.
18. Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии, Л.: Химия, 1988. – 264с.
19. Федорова Г.В. Методичні вказівки до практичних робіт з курсу «Біогеохімія» – Одеса, ОДЕКУ, 2002. – 40с.
20. Федорова Г.В. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Біогеохімія» – Одеса, ОДЕКУ, 2003. – 40с.
21. Федорова Г.В. Практикум з біогеохімії для екологів – Київ: КНТ, 2007. – 288с.

### **1.3 Порядок виконання і оформлення контрольної роботи**

Контроль поточних знань студенів заочного факультету здійснюється на основі виконання завдань контрольної роботи, а також усного опитування на лабораторних і практичних заняттях, захисту лабораторних робіт, а також іспиту на третьому курсі.

Письмова контрольна робота виконується студентом самостійно у відповідності зі спеціальністю і надсилається в деканат заочного факультету навчального закладу на перевірку у термін, який визначений навчальним графіком.

Контрольна робота повинна бути виконана в окремому зошиті, чітким зрозумілим почерком, охайно і у повній відповідності до особистого варіанту. Якщо контрольна робота виконана не за своїм варіантом, вона **не рецензується**.

Варіант контрольної роботи відповідає останній цифрі номера залікової книжки студента. Якщо, наприклад, номер залікової книжки студента **11248**, то студенту необхідно виконувати контрольну роботу за варіантом № **8**.

Всі питання з визначення варіанта контрольної роботи вирішуються на кафедрі хімії навколошнього середовища під час настановної сесії, а номери завдань відповідних 10 варіантів контрольної роботи надані у методичному посібнику.

Умови контрольних завдань та вимоги до їх виконання, а також необхідну додаткову літературу студенти можуть знайти на сайті ОДЕКУ.

Всі умови контрольних завдань та самі завдання, що запропоновані для самостійного розв'язку студентом-заочником, необхідно записати у зошиті із обов'язковим зазначенням номера варіанту, теоретичними коментарями та посиланнями, а також списком використаної літератури. Для зауважень рецензента необхідно залишити поля або окреме місце (бажано кожне завдання починати з нової сторінки). Наприкінці роботи студент ставить свій підпис із вказівкою дати виконання контрольної роботи.

Після реєстрації виконаної контрольної роботи в деканаті заочного факультету та на кафедрі хімії навколошнього середовища, робота перевіряється викладачем та рецензується.

У випадку незаліку контрольну роботу слід виконати заново, або вправити помилки із врахуванням зауважень рецензента, після чого надіслати роботу на повторну перевірку разом із не зарахованою роботою. Робота вважається зарахованою, якщо виконано 60% завдань без зауважень.

У випадку заліку контрольної роботи, але наявності зауважень рецензента, необхідно зробити відповідні виправлення і доповнення до роботи, які слід надати в тому ж зошиті. Виправлену роботу подають на перевірку викладачу під час складання іспиту.

## **1.4. Організація поточного та підсумкового контролю рівня знань студентів**

Накопичувальна система оцінки навчальних досягнень студента враховується згідно з Положеннями про організацію СРС в ОДЕКУ та проведення підсумкового контролю знань студентів.

Сума балів, яку отримав студент за всіма змістовними модулями (заликовою одиницею) навчальної дисципліни «Хімія з основами біогеохімії», формують інтегральну оцінку поточного контролю студента. Вона є підставою для допуску до семестрового іспиту.

Комплекс контрольних заходів розроблено на підставі «Положення про проведення підсумкового контролю знань студентів», затвердженого на засіданні Методичної ради ОДЕКУ від 29 квітня 2010 р., а також «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України» (наказ МОН № 161 від 2.06.1993р.), «Положення про організацію контролю самостійної роботи студентів ОДЕКУ» (наказ № 31 від 6.04.2004р.), «Положення про критерії оцінки знань студентів в ОДЕКУ» (від 29.11.2012 р.), «Інструкція про розрахунок норми часу при плануванні заходів на самостійну роботу студентів ОДЕКУ заочної форми навчання»( від 25.02.2009р.)

Комплекс контрольних заходів регламентує організацію поточного та підсумкового контролю рівня набутих студентами знань, вмінь та навичок у ході вивчення дисципліни «Хімія з основами біогеохімії» (інтегрований план підготовки), а також конкретизує виконання графіку навчального процесу по цій дисципліні з напрямку – 6.040106 «Екологія та охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», спеціалізація – «Агроекологія», освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр.

**Головна мета** проведення кредитно-модульної системи контролю знань – це визначення рівня набутих знань, вмінь та навичок, підвищення якості навчання студентів шляхом активізації навчальної діяльності, стимулювання ритмічного виконання графіку навчального процесу протягом семестру та сесії, визначення кількісних критеріїв засвоєння змісту окремих розділів (змістовних модулів) навчальної дисципліни «Хімія з основами біогеохімії».

### **Методика оцінки всіх видів підготовки студентів**

Кредитно-модульна система оцінки знань, вмінь та навичок передбачає розподіл програми навчальної дисципліни «Хімія з основами біогеохімії» на структурно-логічні завершені розділи (змістовні модулі), які можуть бути оцінені певною кількістю балів.

Модульно-накопичувальна системи оцінки знань студентів заочної форми навчання включає:

- Систему оцінювання самостійної роботи студента (СРС) у міжсесійний період (ОМ).

Вона передбачає перевірку контрольної роботи, яку студенти виконують у міжсесійний період і яка включає теоретичну та практичну частини. Кількісна оцінка за цей вид роботи визначається з урахуванням **терміну** надання роботи на перевірку (на протязі семестру, перед початком заліково-екзаменаційної сесії, безпосередньо перед датою контролюючого заходу), **обсягу** виконання роботи та **глибини** розкриття наданих питань та завдань, а також **оформлення** роботи.

Максимальний бал, що може одержати студент за контрольну роботу складає **75 балів**, з них за 1, 3, 4, 6 та 10 завдання, що містять практичні питання, по 5 балів та за 2, 5, 7, 8, 9 по 10 балів, так як завдання містять як практичні, так і теоретичні питання.

Зарахована контрольна робота свідчить про те, що студент одержав сумарну оцінку не менше 45 балів (27 балів з теоретичної частини і 18 балів з практичної частини), тобто не менше 60% від максимальної суми в 75 балів. Не зарахована контрольна робота свідчить про те, що студент одержав сумарну оцінку меншу за 45 балів, в цьому випадку вона повертається на доробку. Зарахована контрольна робота є допуском до здачі іспиту.

- Систему оцінювання самостійної роботи студента (СРС) під час аудиторних занять (ОЗЕ).

Тут для оцінки ступеня засвоєння основних положень теоретичних розділів дисципліни та оцінки засвоєння практичної частини передбачається виконання низки лабораторних робіт та практичних занять, які охоплюють основні питання практичного розділу дисципліни. Кількісна оцінка за цей вид роботи визначається з урахуванням **ритмічності** роботи студента на протязі занять, **повноти** розкриття тем, **якості** розрахунків та графічних побудов, **достовірності** одержаних висновків, а також результатів **захисту** наданих завдань.

Максимальна оцінка роботи студента під час **заліково-екзаменаційної сесії** складає **25 балів** та включає: оцінку з практичних модулів (усне опитування під час двох лабораторних робіт – **8** балів, захист виконаних двох лабораторних робіт – **12** балів та усне опитування і розв’язок задач на практичних заняттях – **5** балів).

Студент вважається допущеним до заходу підсумкового контролю з навчальної дисципліни, якщо він виконав всі види робіт поточного контролю, передбачені робочою навчальною програмою дисципліни і набрав за накопичувальною системою суму балів не менше 50% від максимально можливої за дисципліну, своєчасно виконав міжсесійні контрольні роботи.

### Форми контролю рівня засвоєння змістовних модулів (ЗМ):

- усне опитування під час практичних, лабораторних та лекційних занять – УО;
- розв'язування задач під наглядом викладача на практичних заняттях – РЗ;
- захист лабораторної роботи – ЗЛР;
- письмова контрольна робота – КР (ОМ).

Загальна кількість змістовних модулів визначена згідно з «Положенням про організацію модульного контролю» і відповідає розподіленню робочої програми дисципліни на завершенні структурно-логічні розділи у відповідності з проведеним навчальних занять: 2 змістовних модулів з теоретичної (лекційної) частини курсу (ЗМ-Л1 та ЗМ-Л2) та 3 змістовних модулів з практичної частини (практичні та лабораторні заняття) курсу (ЗМ-П1, ЗМ-П2, ЗМ-П3). Підсумкова оцінка в балах складається з суми балів за кожен змістовний модуль. Види завдань та кількість балів, що нараховані за виконання певного виду завдання зведені у таблицю 1.

Табл.1

<i>№</i>	<i>Види завдань, за які нараховують бали.</i>	<i>Кількість балів, що нараховані за виконання певного виду завдання</i>
1	Змістовний модуль №1 – практичний, складається з розрахункових задач, КР (ОМ) (ЗМ-П1)	10
2	Змістовний модуль №2 – теоретичний, складається з питань, КР (ОМ) (ЗМ-Л1)	20
3	Змістовний модуль №3 – практичний, складається з розрахункових задач, КР (ОМ) (ЗМ-П2)	10
4	Змістовний модуль №4 – теоретичний, складається з питань, КР (ОМ) (ЗМ-Л2)	25
5	Змістовний модуль №5 – практичний, складається з розрахункових задач, КР (ОМ) (ЗМ-П3)	10
6	Усне опитування (УО) та рішення розрахункових завдань (РЗ) на практичних заняттях (ОЗЕ)	5 (2,5 бали за 1 УО або 1 РЗ)
7	Усне опитування (УО) та рішення розрахункових завдань (РЗ) на лабораторних заняттях (ОЗЕ)	8 (4 бали за 1 УО або 1 РЗ)
8	Підготовка протоколів лабораторних робіт та їх захист(ОЗЕ)	12 (по 6 балів за 1 захист)
	Усього за семестр:	100

Сума отриманих балів складається з суми виконаних своєчасно контрольних заходів. Студент вважається допущеним до підсумкового

контролю, якщо він виконав всі види робіт та своєчасно виконав контрольну роботу(ОМ) передбачену робочою навчальною програмою дисципліни «Хімія з основами біохімії» і набрав за модульною системою суму балів не менше 50% від максимального можливої за дисципліну.

**Іспит** – це письмова форма підсумкового контролюючого заходу, який проводиться в період заліково-екзаменаційної сесії. Під час іспиту перевіряється засвоєння студентом теоретичного та практичного матеріалу (знань, вмінь та навичок, що зазначені у програмі дисципліни) з окремої навчальної дисципліни за семестр (навчальний рік). Оцінка успішності виконання студентом цього заходу здійснюється у формі кількісної оцінки (бал успішності).

**Кількісна оцінка заходу підсумкового контролю (ОПК).** Екзаменаційні білети містять 20 тестів закритого типу, та оцінюються по 5 балів кожне питання і сумарна кількість балів складає максимально **100 балів.**

- Оцінки за іспит виставляються як кількісна, так і якісна таким чином:

- **четирьохбалльна** (відмінно, добре, задовільно, незадовільно) – для форми семестрового (річного) контролю у вигляді семестрового (річного) іспиту;

- **Система накопичувальної підсумкової оцінки засвоєння студентами начальної дисципліни (ПО).**

Накопичена підсумкова оцінка засвоєння студентами заочної форми навчальної дисципліни розраховується, як:

$$\text{ПО} = 0,5 \text{ ОПК} + 0,25 (\text{ОЗЕ+ОМ}) \%$$

Загальна підсумкова оцінка знань студента складається з середньоарифметичної від суми, яку набрав студент у міжсесійний період, під час заліково-екзаменаційної сесії та складання іспиту. Таким чином студент може одержати максимально **100 %.** Якісна оцінка визначається за шкалою ECTS:

Табл.2

<i>За шкалою ECTS</i>	<i>За національною системою</i>	<i>Визначення</i>	<i>За системою університету (в процентах)</i>
A	5 (відмінно)	Відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок	90-100
B	4 (добре)	Вище середнього рівня з кількома помилками	82-89,9
C	4 (добре)	В цілому правильна робота з певною кількістю грубих помилок	74-81,9
D	3 (задовільно)	Непогано, але зі значною кількістю помилок	64-73,9
E	3 (задовільно)	Виконання задовільняє мінімальні критерії	60-63,9
FX	2 (незадовільно)	З можливістю пересклсти	35-59,9
F	2 (незадовільно)	З обов'язковим повторним курсом навчання	1-34,9

## ВАРИАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

### КОНТРОЛЬНА РОБОТА №1

<i>№ вар.</i>	<i>Номери контрольних завдань</i>				
<b>01</b>	1	11	21	31	41
<b>02</b>	2	12	22	32	41
<b>03</b>	3	13	23	33	43
<b>04</b>	4	14	24	34	44
<b>05</b>	5	15	25	35	45
<b>06</b>	6	16	26	36	46
<b>07</b>	7	17	27	37	47
<b>08</b>	8	18	28	38	48
<b>09</b>	9	19	29	39	49
<b>10</b>	10	20	30	40	50

## **ІІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО СРС ПРИ ВИКОНАННІ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ**

*Загальні поради:* вивчити теоретичний матеріал розділів і тем дисципліни, відповісти на питання до самоконтролю, використовуючи рекомендовану літературу. Виконати розрахункові завдання з поясненнями та вказати використані закони, закономірності чи правила.

*Методичне забезпечення:* посібники та підручники з загальної і колоїдної хімії, біохемії, а також методичні вказівки є в наявності в бібліотеці ОДЕКУ і на кафедрі хімії навколошнього середовища.

### **Модуль 1 (теоретичний); модулі 2 і 3 (практичні)**

#### **1 ОСНОВНІ ЗАКОНИ ХІМІЇ**

При самостійному вивченні теми 1 студента необхідно спиратися на шкільні знання основ хімії та вивчити основні поняття та їх визначення. Атомні і молекулярні маси. Моль. Закон збереження маси-енергії. Закон сталості складу. Закон кратних відношень. Закон об'ємних відношень. Закон еквівалентів. Закон Авогадро і наслідки. Хімічні символи, формули, рівняння. Класи неорганічних речовин.

Студентам слід використовувати наступну літературу: [1] С.20-40, [5] С.6-44, [10] С.5-38, [11] С.10-35.

#### **2 ХІМІЧНА БУДОВА РЕЧОВИНІ**

##### *2.1 Будова атома*

Самостійне вивчення другої теми студента необхідно починати з планетарної моделі атома Резерфорда-Бора-Зоммерфельда. Квантова теорія світла Планка. Атомні спектри. Енергетичний стан електрона в атомі. Кvantові числа. Електронні формули атомів. Класифікація елементів в залежності від електронної будови їх атомів: *s*-, *p*-, *d*-, *f*-елементи Періодичної системи. Періодичний закон Д.І. Менделєєва. Залежність властивостей елементів від електронної будови їх атомів.

Студентам слід використовувати наступну літературу: [1] С.60-109, [5] С.44-71, [11] С.71-85.

##### *2.2 Природа хімічного зв'язку*

Студент повинен мати уявлення про теорії хімічного зв'язку. Ковалентний зв'язок. Метод валентних зв'язків. Неполярний і полярний ковалентний зв'язок. Направленість ковалентного зв'язку і форма простих молекул. Гіbridизація електронних орбіталей. Метод молекулярних орбіталей. Йонний зв'язок. Комплексні сполуки. Водневий зв'язок. Міжмолекулярна взаємодія. Аморфний і кристалічний стан речовини.

Студентам слід використовувати наступну літературу: [1] С.118-158, [5] С.71-95, [11] С.98-108.

### **3 ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ПЕРЕБІGU ХІMІЧНИХ РЕАКЦІЙ**

#### **3.1 Термохімія**

Дуже важливим у природі є розгляд питання теплового ефекту хімічної реакції. Закон Гесса і наслідки з нього. Термодинамічні величини. Внутрішня енергія і ентальпія. Напрям хімічної реакції. Ентропія та енергія Гіббса.

Студентам слід використовувати наступну літературу: [1] С.170-204, [5] С.95-123, [11] С.148-169, [16] С.6-14.

#### **3.2 Хімічна кінетика та рівновага**

Студенту необхідно знати залежність швидкості реакції від температури і природи реагуючих речовин. Закон діючих мас. Залежність швидкості реакції від температури і природи реагуючих речовин. Швидкість реакцій в гетерогенних системах. Хімічна рівновага. Константа рівноваги. Порушення хімічної рівноваги. Принцип Ле-Шательє. Рівновага у гомогенних і гетерогенних системах.

Студентам слід використовувати наступну літературу: [1] С.187-193, [5] С.95-123, [11] С.175-1190, [16] С.15-32.

## **4 РОЗЧИНИ**

#### **4.1 Загальна характеристика розчинів**

При вивченні фізико-хімічних властивостей води студенту необхідно звернути увагу на процес розчинення та його стадії; розчинність; концентрація розчинів; осмос; тиск пари розчинів; кристалізація і кипіння розчинів; осмотичний тиск розчинів.

Студентам слід використовувати наступну літературу: [1] С.237-246, [5] С.123-157, [11] С.193-203, [17] С.5-24, [18] С.86-123.

#### **4.2 Водні розчини електролітів**

Під час самостійного вивчення теорії електролітичної дисоціації слід звернути увагу на слабкі та сильні електроліти. Момент повної гідратації. Йонні пари. Активна концентрація йонів. Коефіцієнт активності. Йонна сила розчину. Рівняння Дебая-Гюккеля.

Розчини слабких електролітів. Константа та ступінь дисоціації. Ізотонічний коефіцієнт. Ступінчастий механізм дисоціації слабких кислот та основ. Закон розведення Оствальда.

Студентам слід використовувати наступну літературу: [1] С.246-252, [5] С.123-157, [11] С.205-220., [17] С.24-35.

#### **4.3 Електролітична дисоціація води. Гідроліз солей.**

Студентам треба ознайомитися з дисоціацією води. Водневий показник. Гідроліз солей. Константа гідролізу. Добуток розчинності.

Властивості кислот, основ і солей з точки зору електролітичної дисоціації.

Студентам слід використовувати наступну літературу: [1] С.248-271, [5] С.123-178, [11] С.220-236, [17] С.37-49.

## **Модуль 4 (теоретичний); модуль 5 (практичний)**

### **5 ОСНОВИ ЕЛЕКТРОХІМІЇ**

Вивчення даної теми слід почати з повторення таких понять, як ступінь окислення елементів, вивчити окисно-відновні реакції, розв'язування їх методом електронного балансу і методом йонно-електронного балансу; розглянути поняття про електродний потенціал, його залежність від концентрації розчину, рівняння Нернста; принцип роботи гальванічного елементу, окисно-відновні процеси на електродах, розраховувати електрорушійну силу гальванічного елементу; розглянути корозію металів, її види та типи, механізм руйнування металів та сплавів в результаті електрохімічної корозії та знати методи захисту металів від корозії; мати уявлення про електроліз, процеси на електродах, робити розрахунки за законами Фарадея.

Теоретичні знання і практичні навички студенти можуть отримати після опрацювання наступної рекомендованої літератури: [1] С.271-308; [5] С.178-220; [14] С.5-60.

### **6 ДИСПЕРСНО-КОЛОЇДНІ СИСТЕМИ**

При вивченні теми 6 необхідно студентам звернути увагу на такі питання: загальну характеристику дисперсних систем, їх особливості; класифікація дисперсних систем; фізико-хімічні властивості грубо дисперсних систем: суспензій, емульсій, пін, аерозолів; молекулярно-кінетичні властивості колоїдних систем; седиментаційна рівновага; гіпсометричний закон Лапласа; адсорбція; особливості стану речовини на межі поділу фаз; поверхнева енергія, поверхневий натяг, поверхнево-активні (ПАР) і поверхнево-інактивні (ПІР) речовини; рівняння Шишковського; поверхнева активність речовин, правило Дюкло-Траубе; орієнтація молекул ПАР на межі розподілу розчин-газ; гідролізація і гідрофобізація поверхні; оптичні властивості гетерогенних систем, розсіювання світла в колоїдно-дисперсних системах, рівняння Релея і умови його застосування, поглинання світла колоїдно-дисперсними системами, закон Ламберта-Бугера-Бера; електричні властивості золів, електрокінетичні явища: електрофорез, електроосмос; будова подвійного електричного шару на межі розподілу дисперсна фаза-дисперсійне середовище, будова колоїдних частинок, міцели; стійкість колоїдних систем; коагуляція колоїдно-дисперсних систем; коагулююча дія розчинів електролітів, правило значності Шульце-Гарді; види коагуляції та застосування коагуляції.

Теоретичні знання і практичні навички студенти можуть отримати після опрацювання наступної рекомендованої літератури: [1] С.314-350; [1] С.211-230; [3] С.5-31.

## 7. ОСНОВИ БІОГЕОХІМІЇ

Вивчення теми 7 від студентів вимагає широкої ерудиції в природничих науках, вміння аналізувати факти, робити правильні висновки. Почати вивчення теми слід з понять, термінів та історії формування науки, ролі В.І. Вернадського в цьому процесі. Розглянути вчення про біосферу в розумінні В.І. Вернадського та сучасні погляди про , склад та фізико-хімічну характеристику біосфери. Мати чітке поняття про живу речовину її властивості, функції; органічні речовини та їх трансформацію, про роль ґрунтів та їх внесок в розвиток біосфери; міграцію речовин, її типи; біогеохімічні функції живої речовини.

Окрім того, слід вивчити фактори, що впливають на хімічний склад рослин; бар'єрні та без бар'єрні організми, біологічний кругообіг речовин, як форма розвитку планети та загальні закономірності біогеохімічного кругообігу речовин; поняття про ноосферу, особливості техногенної міграції елементів.

Теоретичні знання і практичні навички студенти можуть отримати після опрацювання наступної рекомендованої літератури: [2] С.5-114; 120-129; 130-140; 143-196; 199-307.

## ВКАЗІВКИ ДО РІШЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

**Модуль 1 (теоретичний); модулі 2 і 3 (практичні)**

**Теоретичні положення, приклади розв'язання завдань**

### Розділ 1 ОСНОВНІ ЗАКОНИ ХІМІЇ

#### 1.1 Основні закони і хімічні поняття

Матеріал є в [1] С.19–21. Слід звернути увагу на такі поняття:

Моль – це кількість речовини, що містить стільки структурних одиниць (молекул, атомів, йонів, електронів та ін.), скільки атомів міститься в 0,012 кг ізотопу Карбону  $^{12}C$ . (Позначають -  $\nu$  –«ню»).

Кількість речовини  $\nu$  – це відношення числа молекул  $N$ , що містяться в даній речовині, до числа  $N_A$  атомів у 0,012 кг Карбону.

Кількість структурних одиниць (атомів) в 0,012 кг Карбону можна визначити, знаючи масу одного атома Карбону ( $1,993 \cdot 10^{-26}$  кг):

$$N_A = \frac{0,012 \text{ кг/моль}}{1,993 \cdot 10^{-26} \text{ кг}} = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ моль}^{-1}.$$

Це число називають *сталою Авогадро* ( $N_A$ ), (розмірність моль<sup>-1</sup>) і показує число структурних одиниць у 1 моль будь-якої речовини.

*Молярна маса* ( $M$ ) – величина, що дорівнює відношенню маси речовини до кількості речовини (одиниця виміру – кг/моль або г/моль):

$$M = \frac{m}{v}.$$

Чисельне значення молярної маси  $M$  в г/моль дорівнює відносній молекулярній масі. Наприклад,

$$\begin{aligned} M_r(Na) &= 23, & M(Na) &= 23 \text{ г/моль}; \\ M_r(NaCl) &= 58,5, & M(NaCl) &= 58,5 \text{ г/моль}. \end{aligned}$$


*Молярний об'єм* ( $V_m$ ) – величина, що дорівнює відношенню об'єму речовини до кількості речовини в цьому об'ємі (одиниця молярного об'єму – м<sup>3</sup>/моль або дм<sup>3</sup>/моль):

$$V_m = \frac{V}{v}.$$

При кількості речовини  $v = 1$  моль  $V_m = 22,4 \text{ дм}^3$  або  $22,4 \cdot 10^{-3} \text{ м}^3$ .

*Хімічний еквівалент речовини* – деяка реальна або умовна частка речовини, яка в кислотно-основних реакціях та реакціях йонного обміну рівноцінна одному атому (одному йону Гідрогену) або заміщує його.

Наприклад в реакції:



одному атому водню відповідає  $1/2$   $Ba(OH)_2$ . Тобто,  $1/2$   $Ba(OH)_2$  є еквівалентом гідроксиду барію в даній реакції. Число  $1/2$  називають *фактором еквівалентності*  $f_{екв}(Ba(OH)_2) = 1/2$ .

В тих випадках, коли  $f_{екв} = 1$ , еквівалент ідентичний самій частинці речовини.

## 1.2 Основні закони хімії ([1] С.22 – 33; [3] С.16–21)

*Закон еквівалентів* ([1] С.33; [3] С.21).

*Фактор еквівалентності простої речовини* дорівнює оберненій величині добутку числа атомів, що складають формулу речовини, на валентність хімічного елемента в даній сполуці. Наприклад,

$$f_{екв}(H_2) = \frac{1}{1 \cdot 2} = \frac{1}{2}; \quad f_{екв}(N_2) = \frac{1}{2 \cdot 3} = \frac{1}{6}; \quad f_{екв}(O_2) = \frac{1}{2 \cdot 2} = \frac{1}{4}.$$

*Фактор еквівалентності кислоти* дорівнює оберненій величині її основності (кількості йонів  $H^+$  у молекулі кислоти, які заміщаються в реакції на метал):

$$f_{екв} \text{ кислоти} = \frac{1}{n(H^+)}$$

$$f_{екв}(HCl) = \frac{1}{1} = 1; \quad f_{екв}(H_3AsO_4) = \frac{1}{3}.$$

*Фактор еквівалентності основ* дорівнює оберненій величині їхній кислотності (кількості йонів  $OH^-$  у молекулі основи, які в реакціях заміщаються на кислотні залишки):

$$f_{екв} \text{ основи} = \frac{1}{n(OH^-)}.$$

Наприклад:  $f_{екв}(NaOH) = \frac{1}{1} = 1; f_{екв}(Zn(OH)_2) = \frac{1}{2}; f_{екв}(Al(OH)_3) = \frac{1}{3}.$

*Для оксидів:* дорівнює оберненій величині добутку числа атомів Оксигену на валентність Оксигену:

$$f_{екв} \text{ оксиду} = \frac{1}{n(O) \cdot B(O)}$$

Наприклад:  $f_{екв}(H_2O) = \frac{1}{1 \cdot 2} = \frac{1}{2}; f_{екв}(CaO) = \frac{1}{1 \cdot 2} = \frac{1}{2}; f_{екв}(Al_2O_3) = \frac{1}{3 \cdot 2} = \frac{1}{6}.$

*Фактор еквівалентності солі* дорівнює оберненій величині добутку числа атомів металу на валентність металу:

$$f_{екв} \text{ солі} = \frac{1}{n(Me) \cdot B(Me)}.$$

Тобто:  $f_{екв}(K_3PO_4) = \frac{1}{3 \cdot 1} = \frac{1}{3}; f_{екв}(ZnSO_4) = \frac{1}{1 \cdot 2} = \frac{1}{2}; f_{екв}(Ca_3(PO_4)_2) = \frac{1}{3 \cdot 2} = \frac{1}{6}$

### 1.3 Закони ідеальних газів ([1] С.22–33; [3] С.16–21)

### 1.4 Приклади розв'язання завдань

*Кількість речовини. Молярна маса*

*Приклад 1.* Знайти кількість речовини молекул у 10 г оксиду  $Cu$  (І).

*Розв'язання:* Молярна маса оксиду Купруму (І) складає

$$M(Cu_2O) = 2A_r(Cu) + A_r(O); M(Cu_2O) = 2 \cdot 64 + 1 \cdot 16 = 144 \text{ г/моль.}$$

Знаходимо кількість речовини

$$v(Cu_2O) = \frac{m(Cu_2O)}{M(Cu_2O)} = \frac{10}{144} = 0,07 \text{ моль.}$$

*Відповідь:* 10 г  $Cu_2O$  містять 0,07 моль молекул  $Cu_2O$ .

Приклад 2. Розрахувати масу хлориду натрію  $NaCl$  за кількістю речовини 0,55 моль.

*Розв'язання:* Молярна маса дорівнює

$$M(NaCl) = 1A_r(Na) + 1A_r(Cl); \quad M(NaCl) = 1 \cdot 23 + 1 \cdot 35,5 = 58,5 \text{ г/моль.}$$

визначаємо масу  $NaCl$ :

$$m(NaCl) = v \cdot M(NaCl); \quad m(NaCl) = 0,55 \cdot 58,5 = 32,175 \text{ г.}$$

*Відповідь:* 32,175 г  $NaCl$  містять 0,55 моль речовини.

### **Газові закони. Молярний об'єм газу. Об'ємна частка**

Для розрахунків за газовими законами за нормальними умов (н.у.):

$P = 101325 \text{ Па} = 1 \cdot 10^5 \text{ Па}; \quad T = 273 \text{ К}$  використовуємо наступні формули:

$$V_m = \frac{V}{v}, \quad v = V \cdot V_m,$$

де  $V_m = 22,4 \text{ дм}^3$  – молярний об'єм газу за н.у.;

$V$  – об'єм газу.

На основі закону Авогадро ([1] С.25; [3] С.19) визначають молярні маси газоподібних речовин. Звідки:

$$v_1 = v_2, \quad v = \frac{m}{M}.$$

де  $m$  – маса газу;  $M$  – молярна маса газу;

$$\text{та } \frac{m_1}{m_2} = \frac{M_1}{M_2},$$

Позначивши  $\frac{m_1}{m_2} = D$ , отримаємо  $D = \frac{M_1}{M_2}$ ;

де  $D$  – відносна густину першого газу за другим.

Дуже часто густину газу визначають відносно найлегшого газу – водню, молярна маса якого дорівнює 2 г/моль:

$$D_{H_2} = \frac{M}{M(H_2)}; \quad \text{так як} \quad M = 2 \cdot D_{H_2}$$

Також густину газу визначають відносно повітря ( $D_{noe}$ ). ( $M_{noe}$ ) = 29 г/моль. У цьому випадку молярна маса визначається:

$$M = 29 \cdot D_{noe}.$$

*Закон Бойля-Маріотта* ([2] С. 30):

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{p_2}{p_1} \quad \text{або} \quad p_1 V_1 = p_2 V_2 = p_3 V_3 = \dots, \quad \text{тобто} \quad pV = \text{const.}$$

*Закон Гей-Люссака:*

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{T_1}{T_2} \quad \text{або} \quad \frac{p_1}{p_2} = \frac{T_1}{T_2} \quad (V = \text{const})$$

*Об'єднаний закон Бойля-Маріотта і Гей-Люссака:*

$$\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2}$$

Якщо здійснюється перехід до нормальних умов, то  $\frac{V_0 p_0}{T_0} = \frac{V p}{T}$ .

Для будь-якого газу кількістю речовини 1 моль величина  $\frac{V_0 p_0}{T_0}$  стала

і однакова, тому її називають універсальною газовою сталою  $R$ .

$$pV = \frac{m}{M}RT, \quad \text{якщо } V, [\text{м}^3] \quad \text{та} \quad pV = 1000 \frac{m}{M}RT, \quad \text{коли } V, [\text{дм}^3].$$

Це рівняння одержало назву *рівняння Менделєєва-Клапейрона* і визнано *рівнянням стану ідеального газу*.

Приклад 1. Знайти об'єм, що займає 100 г кисню  $O_2$ .

$$\text{Розв'язання:} \quad \frac{m}{M} = \frac{V}{V_m},$$

де  $M(O_2) = 32$  г/моль.

$$V = \frac{m \cdot V_m}{M} = \frac{100 \cdot 22,4}{32} = 70 \text{ дм}^3.$$

*Відповідь:* 100 г кисню займає об'єм 70 дм<sup>3</sup>.

Приклад 2. Знайти масу 1 дм<sup>3</sup> метану  $CH_4$  (н.у.).

*Розв'язання:* Маса 1 дм<sup>3</sup> газу – це густина газу, тому використовуємо формули:

$$\rho = \frac{M}{V_m} = \frac{\frac{M}{\rho} \cdot V_m}{V_m} = \frac{16 \text{ г/моль}}{22,4 \text{ л/моль}} = 0,174 \text{ г.}$$

де  $M(CH_4) = 16$  г/моль.

*Відповідь:* маса 1 дм<sup>3</sup>  $CH_4$  дорівнює 0,174 г.

Приклад 3. Знайти молярну масу невідомого газу, якщо відносна густина його за гелієм дорівнює 16.

$$\text{Розв'язок.} \quad M = D(He) \cdot M(He) = 16 \cdot 4 = 64 \text{ г/моль.}$$

де  $M(He) = 4$  г/моль.

*Відповідь:* молярна маса газу дорівнює 64 г/моль.

Приклад 4. Який об'єм займає оксид сульфуру (IV), або діоксид сульфуру ( $SO_2$ ) масою 100 г при температурі 25°C і тиску 125 кПа.

*Розв'язання:* Визначаємо кількість речовини сірководню

$$v(SO_2) = \frac{m(SO_2)}{M(SO_2)}; \quad v(SO_2) = \frac{100}{64} = 1,56 \text{ моль.}$$

де  $M(SO_2) = 64$  г/моль

Визначаємо об'єм газу за н.у.:

$$V(SO_2) = v(SO_2) \cdot V_m; \quad V(SO_2) = 1,56 \cdot 22,4 = 34,9 \text{ л.}$$

Визначаємо об'єм діоксиду сульфуру за даними умовами, користуючись формулою об'єднаного газового закону Бойля-Маріотта і Гей-Люссака:

$$\frac{V_0 p_0}{T_0} = \frac{V_1 p_1}{T_1},$$

де  $p_0 = 101,3$  кПа;  $T_0 = 273$  К;  $V_0$  – тиск, температура, об'єм за н.у.;

$p_1 = 125$  кПа;  $T_1 = (273+20) = 293$  К,  $V_1$  – тиск, температура, об'єм за даних умов.

$$V_1 = \frac{p_0 V_0 T_1}{p_1 T_0}; \quad V_1(SO_2) = \frac{101,3 \cdot 293 \cdot 34,9}{125 \cdot 273} = 30,87 \text{ дм}^3.$$

*Відповідь:* об'єм оксиду сульфуру (IV) дорівнює 30,87 дм<sup>3</sup>.

### Закон еквівалентів

Приклад 1. Визначити молярну масу еквівалента Мангану в оксиді  $Mn_2O_7$ .

*Розв'язання:* Визначаємо валентність Мангану:  $B(Mn) = 7$ .

За формулою  $B = \frac{M}{M_{екв}}$  знаходимо  $M_{екв}(Mn) = \frac{M(Mn)}{B(Mn)}$

$$M_{екв} = \frac{55}{7} = 7,85 \text{ г/моль.}$$

*Відповідь:* молярна маса еквівалента Мангана в оксиді  $Mn_2O_7$  дорівнює 7,85 г/моль.

Приклад 2. Визначити молярну масу еквівалента  $H_3PO_4$ .

*Розв'язання:* За формулою  $M_{екв} = f_{екв} \cdot M$  можна розрахувати  $M_{екв}(H_3PO_4)$ . Для цього потрібно визначити фактор еквівалентності ( $f_{екв}$ ) кислоти:

$$f_{екв}(H_3PO_4) = \frac{1}{n(H^+)}; \quad f_{екв}(H_3PO_4) = \frac{1}{3},$$

$$M_{екв}(H_3PO_4) = f_{екв} (H_3PO_4) \cdot M(H_3PO_4) = \frac{1}{3} \cdot 98 = 32,67 \text{ г/моль.}$$

*Відповідь:* молярна маса еквівалента  $H_3PO_4 = 32,67$  г/моль.

Приклад 3. Обчислити молярну масу еквівалента Феруму, знаючи що його хлорид містить 55,9% Хлору. Яку валентність виявляє Ферум та яка формула хлориду заліза, що утворюється при цьому? Молярна маса еквівалента хлору дорівнює 35,45 г/моль.

*Розв'язання:* Оскільки в умовах наведені масові частки, то відносно до маси сполуки в 100 г, їх можна визнати за маси.

Знаходимо  $m_{Me} = m_{cn} - m_{Cl}$ ;  $m_{Me} = 100 - 55,9 = 44,1$  г

$$\text{Розраховуємо } M_{екв}(Me) \text{ згідно} \quad \frac{m_{Me}}{m_{Cl}} = \frac{M_{екв}(Me)}{M_{екв}(Cl)}$$

$$M_{екв}(Me) = \frac{m(Me) \cdot M_{екв}(Cl)}{m(Cl)}; \quad M_{екв}(Me) = \frac{44,1 \cdot 35,5}{55,9} = 28 \text{ г/моль};$$

$$\text{Обчислюємо валентність: } B(Fe) = \frac{M(Fe)}{M_{екв}(Fe)}; \quad B(Fe) = \frac{56}{28} = 2.$$

Формула хлориду, що утворюється:  $FeCl_2$ .

*Відповідь:* молярна маса еквівалента Ферума = 28 г/моль.

Приклад 4. Чому дорівнює молярна маса еквівалента двовалентного металу, якщо 0,082 г металу при взаємодії з кислотою утворюють  $75,6 \text{ см}^3$  водню. Який це метал, розрахуйте молярну масу еквівалента його оксиду.

$$\text{Розв'язання: } \frac{m(Me)}{V(H_2)} = \frac{M_{екв}(Me)}{V_{екв}(H_2)}, \quad \frac{m(Me)}{M_{екв}(Me)} = \frac{V(H_2)}{V_{екв}(H_2)}$$

де  $V_{екв}(H_2) = f_{екв} \cdot V_m = 1/2 \cdot 22,4 = 11,2 \text{ дм}^3$ .

$$M_{екв}(Me) = \frac{m(Me) \cdot V_{екв}(H_2)}{V(H_2)} = \frac{0,082 \cdot 11,2}{0,0756} = 12,15 \text{ г/моль},$$

то  $M(Me) = B \cdot M_{екв}(Me) = 2 \cdot 12,15 = 24,30 \text{ г/моль}$ . Це метал – Магній.

$$M_{екв}(MeO) = M_{екв}(Me) + M_{екв}(O) = 12,15 + 8 = 20,15 \text{ г/моль}.$$

де  $M_{екв}(O) = f_{екв}(O) \cdot M(O) = 1/2 \cdot 16 = 8 \text{ г/моль}$ .

*Відповідь:* молярна маса еквівалента двовалентного металу дорівнює 12,15 г/моль.

## Розділ 2 ХІМІЧНА БУДОВА РЕЧОВИНИ

### 2.1 Будова атома

У період відкриття перших трьох фундаментальних елементарних частинок – електрона ( $e^-$ ), протона ( $p^+$ ) та нейтрона ( $n^0$ ) – було висунуто цілий ряд моделей будови атома ([2] С.67 - 90, [3] С.44 – 54).

#### 2.1.1 Квантові числа, їх фізичний зміст

Стан електрона в атомі описується чотирма квантовими числами ([1] С.79, 81, 85, 88, [3] С.50, 52).

Слід звернути увагу на такі теоретичні положення:

Для енергетичних рівнів електрона у атомі прийнято такі літерні позначення: головне квантове число  $n$ , яке = **1 2 3 4 5 6 7**

позначення енергетичного рівня **K L M N O P Q**

орбітальне квантове число  $l$ : 0; 1; 2; 3;

енергетичні підрівні  $s, p, d, f$ .

Атомна орбіталь позначають як квадрат:  $\square$ . У такому вигляді вона іменується квантовою коміркою.

Числові значення магнітного квантового числа залежать від орбітального квантового числа і дорівнюють ряду чисел у межах від  $-l$  до 0 та до  $+l$  (табл.1.1).

Таблиця 2.1 – Значення магнітного квантового числа

$l$	$l$ -літерне позначення	$m_l = -l \dots 0 \dots +l$ магнітне квантове число	Кількість орієнтувань $m_l = 2 \cdot l + 1$
0	$s$	0	1
1	$p$	-1, 0, +1	3
2	$d$	-2, -1, 0, +1, +2	5
3	$f$	-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3	7

Спіновий момент кількості руху електрона квантується і може набувати значення  $+1/2$  та  $-1/2$ ; носить назву «спіну», позначають  $m_s$ .


Електрони, які мають одинаковий напрямок спіна  $\uparrow\uparrow$  називаються *паралельними*, при протилежних значеннях спінів  $\uparrow\downarrow$  - *антитаралельними*.

### 2.1.2 Електронні формули атомів ([1] С.88 – 100, [35] С.52 – 54)

#### 2.1.3 Електронні формули атомів у збудженному стані


Наприклад, стаціонарний стан електронів у атомі Сульфуру записується формулою  ${}_{16}S \quad 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$  або  $[Ne]3s^2 3p^4$ .


На третьому енергетичному рівні є вакантні  $d$ -орбіталі, куди можуть при збудженні переходити електрони з  $p$ - та  $s$ -підрівнів третього енергетичного рівня




Електронна формула збудженого стану атома Сульфуру  $S^*$ :

$S^0 \quad 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4 3d^0 + h\nu \rightarrow S^* \quad 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3 3d^1$  або:








Електронна формула  $S^{**} 1s^2 2s^2 2p^6 3s^1 3p^3 3d^2$ .



Внаслідок збудження всі електрони зовнішнього енергетичного рівня Сульфуру стали неспареними, але кількість електронів незмінна.


#### 2.1.4 Електронні формули йонів

Електронні формули йонів відрізняються від електронних формул атомів.



При утворенні позитивних йонів з атомів *s*- та *p*-елементів відривається останній прийнятий електрон з зовнішнього рівня.

При утворенні негативно заряджених йонів, приєднання електронів проходить на неповністю заповнені зовнішні орбіталі атома. Для Сульфуру маємо:



### **2.1.5 Формулювання періодичного закону Д.І. Менделєєва** ([1] С.50-59, [5] С.233–242)

Одним з найважливіших законів природи є періодичний закон, відкритий Д.І. Менделєєвим у 1869 р. ([1] С.50, [5] С.234).

### **2.1.6 Періодична зміна властивостей хімічних елементів**

Місце елемента в таблиці визначається його властивостями і, навпаки, кожному місцю відповідає елемент, що має певну сукупність хімічних властивостей. Тому, знаючи положення елемента в таблиці, можна досить точно вказати на його властивості ([2] С.56-59, [5] С.235 – 238).

### **2.1.7 Приклади розв'язання завдань**

Приклад 1. Записати електронну формулу атома  $Mn$  (Манган).

*Розв'язання:* Електронна формула атома  $^{25}Mn$  така:

$$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^5 \text{ або } [Ar] 4s^2 3d^5$$

де 1, 2, 3, 4, – енергетичні рівні; s, p, d – підрівні.

Приклад 2. Визначити валентні електрони елемента.

*Розв'язання:* Електрони на останньому рівні та попередньому підрівні, якщо він незаповнений, – є валентними.

У  $Mn$   $4s^2 3d^5$  – валентні електрони

останній рівень попередній незаповнений підрівень

Приклад 4. У наведеній електронній формулі  $^{25}Mn 3p^6 4s^2 3d^5$  визначити валентні електрони та охарактеризувати їх за допомогою чотирьох квантових чисел.

*Розв'язання:* Валентні електрони атомів знаходяться на останньому рівні та попередньому підрівні, якщо він незаповнений. Останній рівень – 4. Попередній підрівень –  $3d$  може бути заповнений 10 електронами. Але у  $Mn$  на  $3d$  знаходяться тільки 5 електронів, тобто попередній підрівень не повністю заповнений. Тому валентні електрони  $Mn$  – ... $3d^5 4s^2$  або ... $4s^2 3d^5$

Запишемо кожен електрон окремо та квантові числа:  $n$ ,  $l$ ,  $m_l$ ,  $m_s$  .. Головне квантове число ( $n$ ) вказує на номер енергетичного рівня. Тому для  $3d^1$ ,  $3d^5$  енергетичний рівень дорівнює 3, а для  $4s^1$ ,  $4s^2$  електронів – чотирьом.

Орбітальне квантове число ( $l$ ) електрона вказує на енергетичний підрівень електрона в атомі:  $s$ ,  $p$ ,  $d$  або  $f$ , значення  $l$  для всіх  $d$ -електронів одинакові – 2, а для  $s$ -електронів – 0. Маємо:

-2	-1	0	+1	+2	
↑	↑	↑	↑	↑	
					$4d$

$4d$

$\boxed{\uparrow\downarrow}$

$5s$

- графічне зображення  
валентних електронів  $Tc$

	$n$	$l$	$m_l$	$m_s$
$3d^1$	4	2	-2	-1/2
$3d^2$	4	2	-1	-1/2
$3d^3$	4	2	0	-1/2
$3d^4$	4	2	+1	-1/2
$3d^5$	4	2	+2	-1/2
$4s^1$	5	0	0	-1/2
$4s^2$	5	0	0	+1/2

Кількість орбіталей на тому чи іншому підрівні обумовлена магнітним квантовим числом  $m_l = 2l + 1$  і маємо для  $s$ -підрівня  $= 1$ , для  $p = 3$ , для  $d = 5$ , для  $f = 7$  енергетичних комірок. Кожна комірка має своє значення, яке визначається за формулою  $m_l = -l \dots 0 \dots + l$ .

Так, енергетична комірка на  $s$ -підрівні – одна, її магнітне квантове число набуває значення «0».


На  $p$ -підрівні – 3 енергетичні комірки, які мають значення  $m_l = \langle\langle -1 \rangle\rangle, \langle\langle 0 \rangle\rangle, \langle\langle +1 \rangle\rangle$ . На  $d$ -підрівні – 5 комірок зі значенням  $m_l = \langle\langle -2 \rangle\rangle, \langle\langle -1 \rangle\rangle, \langle\langle 0 \rangle\rangle, \langle\langle +1 \rangle\rangle, \langle\langle +2 \rangle\rangle$ . Так само для  $f$ -підрівня значення  $m_l$  становить  $\langle\langle -3 \rangle\rangle, \langle\langle -2 \rangle\rangle, \langle\langle -1 \rangle\rangle, \langle\langle 0 \rangle\rangle, \langle\langle +1 \rangle\rangle, \langle\langle +2 \rangle\rangle, \langle\langle +3 \rangle\rangle$ .

Таким чином, для  $3d^1$  електрона  $m_l$  дорівнює  $\langle\langle -2 \rangle\rangle$ , а для  $4s^1$  –  $\langle\langle 0 \rangle\rangle$ .


Спінове квантове число ( $m_s$ ) характеризує рух електрона навколо власної осі. Кількість руху електрона квантується і може набувати значення  $+1/2$  та  $-1/2$ . Усі паралельні електрони приймають однакові значення: для  $3d^1$ - $3d^5$  і  $4s^1$  це значення  $\langle\langle -1/2 \rangle\rangle$ , а у  $4s^2$  – антипаралельного електрона –  $\langle\langle +1/2 \rangle\rangle$ .

Приклад 4. Записати електронні формули атомів у збудженному стані та визначити їх максимальну валентність.

*Розв'язання:* Валентні електрони  $_{25}Mn \dots 3d^54s^2$  можна графічно відобразити



Звідси бачимо, що на  $4s$  орбіталі маємо 2 спарених електрони. Якщо додати квант енергії, то їх можна розпарувати, тобто один з електронів перевести на більш високий підрівень. На наступному  $4p$  підрівні маємо вільні енергетичні комірки. Туди після одержання додаткової енергії перейде один електрон з  $4s$ -орбіталі і отримаємо збуджений стан атому  $Mn^*$




У збудженному стані атома зростає валентність. Вона визначається по кількості неспарених електронів. Для  $Mn^*$  валентність дорівнює 7.

Збуджених станів може бути декілька. Це залежить від кількості пар спарених електронів.

Приклад 5. Записати електронні формули йонів з характерним ступенем окиснення для їх атомів:  $Mn$  (Манган).

**Розв'язання:** Йони утворюються коли атом приймає чи віддає електрони. Атом  $Mn$  не може прийняти електрони, бо зовнішній підрівень  $4s$  у нього заповнений – на ньому 2 електрони. А попередній  $4d$  підрівень, на якому 5 електронів не може приймати електрони, бо він закритий – «екранований» зовнішніми  $4s$ -електронами. Тому атом  $Mn$  може тільки віддавати електрони. Електрони покидають зовнішні орбіталі і завжди їх повністю звільнюють:



Звідси зрозуміло, що у  $Mn$  можуть бути 7 ступенів окиснення:  $Mn^0$ ,  $Mn^{+2}$ ,  $Mn^{+3}$ ,  $Mn^{+4}$ ,  $Mn^{+5}$ ,  $Mn^{+6}$ ,  $Mn^{+7}$ .

Приклад 6. Визначити положення елемента в періодичній системі Д.І. Менделєєва за його електронною формулою  $\dots 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2 4d^6$ .

**Розв'язання:** Валентні електрони елементу:  $\dots 5s^2 4d^6$ . Цифра 5 вказує на зовнішній енергетичний рівень, тобто на номер періоду – 5. Кількість валентних електронів:  $2 + 6 = 8$  позначає номер групи – 8. Елемент належить до  $d$ -родини. Елементи  $s$ - і  $p$ -родин належать до головних підгруп, а елементи  $d$ - і  $f$ -родин – до побічних підгруп.

**Відповідь:** елемент, який має  $\dots 5s^2 4d^6$  валентні електрони знаходиться у 5 періоді, 8 групі, побічній підгрупі періодичної системи Д.І. Менделєєва. Цей елемент -  $Ru$  - рутеній.

## 2.2 Хімічний зв'язок

### 2.2.1 Виникнення хімічного зв'язку ([1] С.118 - 160, [5] С.71 – 94)

**Хімічний зв'язок** – це наслідок взаємодії електронів і ядер атомів, що приводить до зменшення енергії системи. Відомі кілька типів хімічного зв'язку. Основними є ковалентний та йонний.

## 2.2.2 Ковалентний зв'язок ([1] С.131-138, [3] С.78–88)

Таблиця 2.2 – Найважливіші характеристики хімічного зв'язку в двохатомних молекулах простих речовин

Формула речовини	Зв'язок	Енергія зв'язку, кДж/моль	Довжина зв'язку, нм
H <sub>2</sub>	H — H	435,0	0,074
F <sub>2</sub>	F — F	159,0	0,142
O <sub>2</sub>	O = O	498,7	0,120
N <sub>2</sub>	N ≡ N	945,6	0,109
Cl <sub>2</sub>	Cl — Cl	242,3	0,198
S <sub>2</sub>	S = S	417,6	0,189
P <sub>2</sub>	P ≡ P	489,1	0,188

## 2.2.3 Метод валентних зв'язків

Утворення хімічного зв'язку – взаємодія електронів зовнішніх електронних орбіталей – валентних електронів ([2] С.130-146, [3] С.79 – 83)


## 2.2.4 Гібридизація орбітальей та просторова конфігурація молекул

Рекомендовано вивчити ([1] С.138 – 142).

Електрони, що беруть участь в утворенні ковалентного зв'язку, перебувають у різних станах, тобто перебувають на різних атомних орбіталях. Рівноцінність їх пояснює теорія гібридизації атомних орбітальей, згідно якої при утворенні молекул відбуваються зміни форм і енергій електронних хмар і утворюються рівноцінні гібридні хмари однакової форми, які мають симетричне положення у просторі.

Напрямок ковалентного зв'язку обумовлює просторову конфігурацію молекул, тобто їх геометричну форму.


Якщо у перекритті електронних хмар приймає участь  $s^1-s^1$  – валентні електрони (наприклад, молекула H<sub>2</sub>) або електрони  $s^1-p^1$  підрівнів (наприклад, молекула HCl) чи електрони  $p^1-p^1$  – підрівнів (молекула Cl<sub>2</sub>), то молекули мають лінійну форму.



Тип гібридизації обумовлено характером електронів, які беруть участь в гібридизації. Наприклад:  $sp$  – гібридні орбіталі, які знаходяться в просторі під кутом 180°. Така  $sp$  – гібридизація характерна для елементів ІІ групи, а їхні молекули мають лінійну форму.


Для елементів ІІІ групи характерна  $sp^2$ -гібридизація. Молекули – плоскої трикутної форми, кут між напрямком зв'язку –  $120^\circ$ .

У молекулі метану  $CH_4$  в утворенні зв'язку беруть участь чотири рівноцінних гібридних орбіталі атому Карбону –  $sp^3$ -гібридизація.




4 зв'язка  $sp^3$ -гібридних хмар утворюють неправильний тетраедр з кутом  $109^\circ 28'$ .


Іншу конфігурацію мають молекули утворені атомами Оксигену та Нітрогену. У молекулі амоніаку  $NH_3$  в утворенні зв'язку приймають участь 3 орбіталі із чотирьох. У атома Нітрогену нема збудженого стану.




Через слабке відштовхування, яке існує між орбіталями, що беруть участь в утворенні зв'язку, та зайнятою  $2s$ -орбітальною, валентний кут змінюється до  $107^\circ 18'$ . При взаємодії трьох атомів утворюється піраміdalна молекула. Такі молекули характерні для елементів VA групи. У молекулі амоніаку три  $p$ -електронні хмари розподіляються по координатним осям і перекриваються з  $s$ -електронами атомів водню. У вершині піраміди знаходиться атом азоту, а в кутах її трикутної основи – атоми водню.



При утворенні молекули води  $H_2O$  у перекритті електронних хмар приймають участь 2 електрони  $p$ -підрівня атома кисню  $/1s^2 2s^2 2p^4/$  та  $s$ -електрони двох атомів водню



При перекриванні  $p$ -електронів з  $s$ -електронами, завдяки взаємному відштовхуванню кут між напрямком зв'язку досягає  $104^\circ 30'$ . Таку форму молекул утворюють атоми елементів VIA групи.



## 2.2.5 Координаційна теорія Вернера і склад комплексних сполук

Доцільно вивчення почати з ([1] С.598-622, [5] С.36–40).

Комплексні сполуки були одержані ще в середині XVIII ст. Ці сполуки мають центричну будову, тобто всі групи, що входять до їх складу, певним чином розташовані навколо атома-комплексоутворювача, або центрального атома (йона).

**Комплексоутворювач** - у переважній більшості йон металу  $Me^{n+}$



Центральним атомом можуть бути майже всі елементи періодичної системи, але найбільшу здатність до комплексоутворення виявляють *d*-елементи. Лужні і лужноземельні метали є найменш активними комплексоутворювачами. Таки неметали, як *B*, *Si*, *P*, *As*, виконують роль центрального атома у комплексних сполуках (КС) типу  $K[BH_4]$ ,  $H_2[SiF_6]$ ,  $K[PF_6]$  тощо ([1] с. 601, [5] с. 37).

Комплексоутворювач характеризується *координаційним числом* (к.ч.), тобто числом, яке показує, скільки простих *лігандів* координується навколо центрального атома. Інакше, к.ч. – це число зв’язків між ними. Утворення комплексу між йоном металу  $Me^{n+}$  і лігандом  $L$  виражаютъ схемами:



Будову молекул деяких комплексних сполук у просторі вперше пояснив А. Вернер у своїй координаційній теорії ([1] с. 599, [5] с. 36).

Сполуки з к.ч. 2 типу  $[Ag(NH_3)_2]^+$ ,  $[Cu(Cl)_2]^-$  характеризуються *sp*-гібридизацією АО центрального атома, отже комплексоутворювач і ліганд розміщаються на прямій лінії:  $H_3N \rightarrow Ag^+ \leftarrow NH_3$

У сполуках з к.ч. 4 можливі три способи розміщення лігандинів навколо комплексоутворювача: у формі тетраедра, піраміди або квадрата. У першому і другому випадках маємо просторові комплекси (тип

гібридизації АО комплексоутворювача  $sp^3$ ), а в останньому – ліганди і комплексоутворювач розміщені в одній площині (гібридизація  $dsp^2$ ).

Комплекси з координаційним числом п'ять відомі менше. Вони мають будову тригональної біпіраміди або квадратної піраміди. Це пентакарбоніл Феруму  $Fe(CO)_5$ , йон  $[MnCl_5]^{3-}$ .

Для координаційних сполук з координаційним числом 6 теоретично можливі три геометричні моделі комплексних йонів: плоский правильний шестикутник, трикутна призма і октаедр. Проте переважна більшість комплексних йонів утворені  $d^2sp^3$  або  $sp^3d^2$  гібридними атомними орбіталями і тому мають октаедричну будову ([1] С.607 – 609).

Таблиця 2.3 – Типи гібридизації орбіталей центрального йона

<i>K.ч.</i>	<i>Гібридні орбіталі центрального йона</i>	<i>Просторова конфігурація гібридних зв'язків</i>	<i>Приклади</i>
2	$sp$	Пряма лінія	$[Ag(CN)_2]^-$ , $[Ag(NH_3)_2]^+$
3	$sp^2$	Рівносторонній трикутник	$NO_3^-$
4	$sp^3$ , $d^3s$	Тетраедр	$NH_4^+$ , $BF_4^-$ , $CrO_4^{2-}$
4	$dsp^2$	Квадрат	$[Ni(CN)_4]^{2-}$ , $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$ , $[Pt(NH_3)_4]^{2+}$
6	$d^2sp^3$ , $sp^3d^2$	Октаедр	$[Co(NH_3)_6]^{3+}$ , $[Fe(CN)_6]^{3-}$ , $[Cd(NH_3)_6]^{3+}$
5	$dsp^3$	Тригональна біпіраміда; квадратна піраміда	$Fe(CO)_5$ , $[CuCl_5]^{3-}$ , $[MnCl_5]^{3-}$

Назви комплексних сполук утворюються таким чином: спочатку в називному відмінку називають катіон (простий або комплексний), потім простий (чи комплексний) аніон. Назви катіонних комплексів не мають спеціальних закінчень, а аніонні мають суфікс **–ат**, що додається до кореня назви центрального атома.

Ліганди, що входять до складу комплексу, перелічують за абеткою. Вказуючи їх число, а потім називають центральний атом і в дужках римськими числами зазначають ступінь його окиснення.

Таблиця 2.4 – Назви комплексних сполук за систематичною номенклатурою

<i>КС з комплексним катіоном</i>	<i>КС з комплексним аніоном</i>	<i>Електронейтральний комплекс</i>
$[Cu(NH_3)_4]SO_4$ тетраамінкупрум (ІІ) сульфат	$K_3[Fe(CN)_6]$ калій гексаціаноферат(ІІІ)	$Fe(CO)_5$ пентакарбоніл феруму
$[Fe(H_2O)_6]Cl_3$ гексаакваферум(ІІІ) хлорид	$Na_3[Al(OH)_6]$ натрій гексагідроксоалюмінат	$Pt(NH_3)_2Br_2$ діаміндибромплатина
$[Cr(OH)_2H_2O(NH_3)_3]Br$ акватриамінгідроксо- хром(ІІІ)бромід	$Cs_2[Pt(CN)_4F_2]$ цезій дифлуоротетра- цианоплатинат(ІV)	$Cr(NH_3)_3(NCS)_3$ триамінтри-(тіоціанато-N) хром

Усі координаційні сполуки, крім електронейтральних (карбонілів перехідних металів  $Me(CO)_n$ ) або комплексів без зовнішньої координаційної сфери типу  $Pt(NH_3)_2Cl_2$ , у водних розчинах виявляють властивості сильних електролітів. Вони легко дисоціюють на комплексний іон та йони зовнішньої координаційної сфери ([2] С.616 - 619, [3] С.40).

У новій хімічній літературі частіше використовують величину, обернену до константи дисоціації комплексу, яку називають *константою утворення комплексу*, або *константою стійкості*, і позначають  $\beta$ :

$$\beta = 1/K_o = 1/K_h$$

### 2.2.6 Приклади розв'язання завдань Полярність хімічного зв'язку, геометрична форма молекул

*Приклад 1.* Визначити міру полярності хімічного зв'язку в молекулах  $AlCl_3$ ,  $H_2S$ ,  $AsH_3$

*Розв'язання:* Міру полярності хімічного зв'язку визначають за різницею значень відносних електронегативностей атомів які утворюють зв'язок. Для цього скористаємося даними таблиці у *додатку 1*.

$AlCl_3$	$EH_{Al} = 1.6$	$EH_{Cl} = 3.0$	$\Delta EH = 1,4$
$H_2S$	$EH_H = 2.1$	$EH_S = 2.6$	$\Delta EH = 0,5$
$AsH_3$	$EH_H = 2.1$	$EH_{As} = 2$	$\Delta EH = 0,1$

Максимальне значення  $\Delta EH$  у  $AlCl_3 = 1,4$ , з наведених це є найполярніший зв'язок.

**Приклад 2.** Визначити геометричну форму молекул  $AlCl_3$ ,  $H_2S$ ,  $AsH_3$  та  $BCl_3$ ,  $CCl_4$ .

**Розв'язання:** По-перше, необхідно встановити, до якого типу молекул належать молекули заданих речовин (типи:  $A_2$ ,  $AB$ ,  $B_2$ ,  $A_2B$ ,  $A_3B$ ,  $AB_2$ ,  $AB_3$ ,  $AB_4$ ; де **A** – атом менш електронегативного елементу, **B** – більш електронегативного елементу). Якщо це молекули  $A_2$ ,  $AB$ ,  $B_2$ , то вони двоатомні і мають лінійну форму. Якщо молекули складаються з більш ніж двох атомів, то необхідно:

○ Знайти центральний атом та його валентність:

$AlCl_3$ , центральний атом  $Al$ , валентність III;

$H_2S$  центральний атом  $S$ , валентність II;

$AsH_3$  центральний атом  $As$ , валентність III;

$BCl_3$  центральний атом  $B$ , валентність III;

$CCl_4$  центральний атом  $C$ , валентність IV.

○ Скласти електронну та електронно-графічну формули енергетичних рівнів центрального атома, електрони яких беруть участь в утворенні хімічних зв'язків. Оскільки центральні атоми – елементи головних підгруп, то їх валентні електрони розміщені тільки на зовнішньому енергетичному рівні:  $_{13}Al \dots 3s^2 3p^1$ ,  $_{16}S \dots 3s^2 3p^4$ ,  $_{15}As \dots 4s^2 4p^3$ ,  $_{4}Be \dots 2s^2$ ,  $_{5}B \dots 2s^2 2p^1$ ,  $_{6}C \dots 2s^2 2p^2$ .

○ Порівняти валентність центрального атома в молекулі з кількістю його неспарених електронів у незбудженому стані. Якщо є незбіжність, то спостерігається гібридизація валентних орбіталей, якщо ж збігається, - то гібридизація відсутня.

**$AlCl_3$ .** Для атома  $Al$  кількість неспарених електронів у нормальному (не збудженному) стані дорівнює одиниці, а в сполуці його валентність – III. Тобто атом  $Al$  повинен перейти до збудженого стану:  $3s^2 + h\nu \rightarrow 3s^1 3p^2$ .

В утворенні зв'язку повинні брати участь один  $s$ - і два  $p$ -електрони, слід припустити гібридизацію одного  $s$ - і двох  $p$ -електронів, це  $sp^2$ -гібридизація атомних орбіталей центрального атома  $Al$ . Утворює молекули плоско трикутної форми з валентним кутом  $120^\circ$ .

**$H_2S$ .** Для атома  $S$  кількість неспарених електронів у не збудженному стані дорівнює двом, збігається з його валентністю в  $H_2S$ . Оскільки обидва неспарених електрона орієнтовані по двох взаємно перпендикулярних осіах, молекули сполуки матимуть кутову форму з валентним кутом  $\approx 90^\circ$ .

**$AsH_3$ .** Атом  $As$  в молекулі має три неспарених електрони, тому для нього не потрібно збудженого стану. Три ковалентні зв'язки розташовуються під кутом до атома  $As$ , який знаходиться у вершині тригональної піраміди.

**$BCl_3$ .** Для атома  $B$  кількість неспарених електронів у нормальному (не збудженному) стані дорівнює одиниці, а в сполуці його валентність – III. Тобто атом  $B$  повинен перейти до збудженого стану:  $2s^2 + h\nu \rightarrow 2s^1 2p^2$ .

В утворенні зв'язку повинні брати участь один  $s$ - і два  $p$ -електрони, слід припустити гібридизацію одного  $s$ - і двох  $p$ -електронів, це  $sp^2$ -гібридизація атомних орбіталей центрального атома В, утворює молекули плоско трикутної форми з валентним кутом  $120^\circ$ .


**$CCl_4$** . Для атома С кількість неспарених електронів у нормальному (не збудженному) стані дорівнює двом, а в сполучі його валентність – IV. Тобто атом с повинен перейти до збудженого стану:  $2s^2 + h\nu \rightarrow 2s^1 2p^3$ .

В утворенні зв'язку повинні брати участь один  $s$ - і три  $p$ -електрони, слід припустити гібридизацію одного  $s$ - і трьох  $p$ -електронів, це  $sp^3$ -гібридизація атомних орбіталей центрального атома С. Утворює тетраедр, в якому кут дорівнює  $109^\circ 28'$ .

### **Комплексні сполуки**

Приклад 1. З частинок  $Cu^{2+}$ ,  $Sr^{2+}$ ,  $CN^-$  скласти формулу комплексної сполуки та рівняння реакцій за якими можна добути ці сполуки. Дати назву сполуці.

**Розв'язання.** Треба визначити центральний атом – комплексоутворювач. Це може бути  $Cu^{2+}$  або  $Sr^{2+}$ , оскільки в більшості випадків центральній атом – це позитивно заряджений йон. Найчастіше це  $d$ -елемент, у даному випадку йон  $Cu^{2+}$   $d$ -елемент, тобто він може бути комплексоутворювачем. К.ч., як правило, вдвічі більше за ступінь його окиснення, тобто дорівнює 4. Йони  $Sr^{2+}$ ,  $s$ -елемента утворюватимуть зовнішню сферу комплексної сполуки, а ліганди – нейтральні молекули або негативні йони – це  $CN^-$ . Отже, отримана формула  $Sr[Cu(CN)_4]$ . Наведений комплекс можна добути за реакціями:



Приклад 2. Дати назву сполукам:  $[Ni(NH_3)_4]Cl_2$ ,  $[Pt(NH_3)_4Cl_2]SO_4$ ,  $[Co(NH_3)_5Cl]Cl_2$ ,  $[Cr(H_2O)_6]Br_3$ ,  $[Cu(NH_3)_4](OH)_2$ ,  $Ca[BeF_4]$

**Розв'язання:**

Відповідно таблиці 4 назви комплексних сполук наступні:

$[Ni(NH_3)_4]Cl_2$  – тетрааміннікеля(ІІ) хлорид;

$[Pt(NH_3)_4Cl_2]SO_4$  – тетрааміндихлороплатини(ІV) сульфат;

$[Co(NH_3)_5Cl]Cl_2$  – пентаамінхлорокобальта(ІІІ) хлорид;


$[Cr(H_2O)_6]Br_3$  – гексааквахрома(ІІІ) бромід;

$[Cu(NH_3)_4](OH)_2$  – тетраамінкупрума(ІІ) гідроксид;

$Ca[BeF_4]$  – кальцій тетрафлуороберилат(ІІ).

Приклад 3. Записати рівняння процесу дисоціації комплексної сполуки  $Sr[Cu(CN)_4]$ .

*Розв'язання:*




Приклад 4. Навести вираз для константи нестійкості комплексного йона  $[Cu(CN)_4]^{2-}$ .

*Розв'язання:* Другий ступінь дисоціації – процес зворотний, його можна охарактеризувати константою хімічною рівноваги або константою нестійкості що до наведеного випадку.

$$K_h([Cu(CN)_4]^{2-}) = \frac{[Cu^{2+}] \cdot [CN^-]}{([CuCN]_4)^{2-}} = 5 \cdot 10^{-28}.$$

Приклад 5. Скласти рівняння реакції обміну між комплексною сполукою  $Sr[Cu(CN)_4]$  і сульфатом натрію.

*Розв'язання.* Рівняння реакції має вигляд:



З наведеного рівняння витікає, що в даному випадку внутрішня сфера комплексної сполуки у хімічній реакції веде себе як єдине ціле з негативно зарядженим ступенем окиснення, це іон  $[Cu(CN)_4]^{2-}$ .

### Розділ 3 ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ПЕРЕБІГУ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ

Після вивчення матеріалу цього розділу *необхідно знати* такі поняття «фаза», «система», «тепловий ефект»; параметри системи та функції стану системи, екзотермічний та ендотермічний процеси. *Вміти* розраховувати тепловий ефект хімічної реакції, ентропійний фактор системи та можливість самовільного перебігу реакції. *Мати уявлення* про основні поняття хімічної кінетики, про залежність швидкості хімічної реакції від різних факторів. *Вміти* записати вираз для швидкості та константи рівноваги згідно із законом діючих мас, визначати напрям зміщення рівноваги при зміні в системі одного з факторів; характер зміни параметрів у системі з метою зміщення рівноваги в бажаному напрямку; придбати практичні навички розрахунків з хімічної кінетики.

### **3.1 Термохімія**

#### **3.1.1 Енергетика хімічних процесів** ([1] С.169 - 208, [5] С.95 – 121)

Хімічна термодинаміка використовує деякі поняття: *термодинамічна система*. Системи можуть бути *гомогенними* та *гетерогенними*.

#### **3.1.2 Теплові ефекти реакцій** ([1] С.170 - 173, [5] С.98 – 101)

За тепловим ефектом хімічної реакції поділяються на 2 групи: *екзотермічні* та *ендотермічні*.

#### **3.1.3 Внутрішня енергія**

Кожна система має певний запас енергії, яку називають *внутрішньою енергією* ( $U$ ). ([2] С.199 - 201, [3] С.97 – 98)

#### **3.1.4 Термохімічні закони** ([2] С.172, [3] С.101)

Наслідки закону Гесса  $\Delta H_{298\text{ утв}}^0 = -\Delta H_{298\text{ розкл}}^0$   
 $\Delta H_{x.p.} = \sum n\Delta H_{утв(кін.)} - \sum n\Delta H_{утв(вихідн.)}$

Для термохімічних обчислень використовують наслідки із закону Гесса (стандартні термодинамічні константи наведено у додатках методичних вказівок).

*Ентропія* ([2] С.202, [3] С.102).  $\Delta S = \frac{Q}{T}$ .

Термодинамічна функція стану системи ([2] С.203, [3] С.103).

$$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S; \quad G = f(p, T)$$




#### **3.1.5 Приклади розв'язання завдань**

Приклад 1. Розрахувати ентальпію хімічного процесу



та визначить який це процес.

*Розв'язання:* Якщо в рівнянні є сполуки які дисоціюють, то доцільно записати скорочене молекулярно-йонне рівняння:



Вказуємо  $\Delta H_{298}^0$  табличні в кДж/моль під формулами скороченого рівняння.

Правило Гесса у загальному вигляді:

$$\Delta H_{x.p.} = \sum n\Delta H^{\circ}_{298 \text{ (кінц.)}} - \sum n\Delta H^{\circ}_{298 \text{ (вихідн.)}}$$

Для даного рівняння має вигляд:

$$\begin{aligned}\Delta H_{x.p.} &= [\Delta H^{\circ}_{298}(NO_3^-) + \Delta H^{\circ}_{298}(NO_2^-) + \Delta H^{\circ}_{298}(H_2O)] - [2\Delta H^{\circ}_{298}(NO_2) + \\ &+ 2\Delta H^{\circ}_{298}(OH^-)] = [-206,6 + (-106,3) + (-285,8)] - [2 \cdot 33,5 + 2(-229,94)] = \\ &= 498,7 - (-392,88) = -498,7 + 392,88 = -105,82 \text{ кДж}\end{aligned}$$

*Відповідь:*  $\Delta H_{x.p.} < 0$  (-105,82 кДж), процес екзотермічний, тепло виділяється.

Приклад 2. Визначити можливість самовільного перебігу реакції за стандартних умов:  $CO(g) + H_2O(p) = CO_2(g) + H_2(g)$

-137,27	-237,19	-394,38	0
---------	---------	---------	---

*Розв'язання:* Відомо, що  $\Delta G$  є функцією стану,  $\Delta G^{\circ}_{298}$  – табличні данні (**додаток 4**), маємо:

$$\begin{aligned}\Delta G_{x.p.} &= \sum n\Delta G^{\circ}_{298 \text{ прод. (кінц.)}} - \sum n\Delta G^{\circ}_{298 \text{ поч. реч. (вихідн.)}} \\ \Delta G_{x.p.} &= -394,38 - (-137,27 - 237,19) = -19,28 \text{ кДж}\end{aligned}$$

*Відповідь:* пряма реакція можлива за стандартних умов, оскільки  $\Delta G < 0$ .

Приклад 3. Реакція описується рівнянням:  $NH_4Cl(s) = NH_3(g) + HCl(g)$ . Визначте можливість самодовільного перебігу реакції за стандартних умов. При якій температурі почнеться розклад  $NH_4Cl$ ?

*Розв'язання:* Обчислимо  $\Delta G$  за рівнянням:  $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ .

Функції стану визначаємо:

$$\begin{aligned}\Delta H_{x.p.} &= \sum n\Delta H^{\circ}_{298 \text{ утв (кінц.)}} - \sum n\Delta H^{\circ}_{298 \text{ утв (вихідн.)}} \\ \Delta S_{x.p.} &= \sum n\Delta S^{\circ}_{298 \text{ утв. (кінц.)}} - \sum n\Delta S^{\circ}_{298 \text{ утв. (вихідн.)}}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Тому: } \Delta H_{x.p.} &= (\Delta H^{\circ}_{298}(NH_3) + \Delta H^{\circ}_{298}(HCl)) - \Delta H^{\circ}_{298}(NH_4Cl) = \\ &= (-46,19 - 32,30) - (-313,39) = 176,9 \text{ кДж/моль},\end{aligned}$$

де  $\Delta H^{\circ}_{298}$  табличні значення

$$\begin{aligned}\Delta S_{x.p.} &= (S^{\circ}_{298}(NH_3) + S^{\circ}_{298}(HCl)) - S^{\circ}_{298}(NH_4Cl) = \\ &= (192,5 + 186,7) - 94,56 = 284,6 \text{ Дж/(моль}\cdot\text{К}) = 0,2846 \text{ кДж/(моль}\cdot\text{К}) \\ \Delta G_{x.p.} &= 176,9 - 0,2846 \cdot 298 = 176,9 - 84,8 = 92,1 \text{ кДж/моль}\end{aligned}$$

Оскільки  $\Delta G_{x.p.} > 0$ , то за стандартних умов реакція неможлива, відбувається зворотня реакція. Обчислюємо температуру, при якій  $\Delta G_{x.p.} = 0$ , тобто  $\Delta H = T\Delta S$ :

$$T = \frac{\Delta H}{\Delta S} = \frac{176,9}{0,2846} = 621,5 \text{ К}$$

*Відповідь:* реакція можлива при температурі 621,6 К ( $621,5 - 273 = 348,8^\circ\text{C}$ )

Приклад 4. Визначте зміну ентропії  $\Delta S$  процесу плавлення 90 г льоду, тобто фазового переходу  $H_2O(k) - H_2O(p)$ , за стандартними умовами.

*Розв'язання:* Функція стану  $\Delta S$  може бути обчислена за I наслідком закону Гесса:

$$\Delta S_{x.p.} = \sum nS^\circ_{298 \text{ утв. (кінц.)}} - \sum nS^\circ_{298 \text{ утв. (вихідн.)}}$$

$$\Delta S_{\text{плав.}} = S^\circ_{298} H_2O(p) - S^\circ_{298} H_2O(k) = 70,1 - 39,3 = 30,8 \text{ Дж/(моль К)}.$$

Обчислюємо кількість моль льоду  $v$ :


$$v = \frac{m}{M} = \frac{90 \text{ г}}{18 \text{ г/моль}} = 5 \text{ моль.}$$

Зміна ентропії при плавленні 90 г льоду дорівнює:

$$\Delta S_{\text{плав.}} = 30,8 \text{ Дж/(моль К)} \cdot 5 \text{ моль} = 154 \text{ Дж/К.}$$

*Відповідь:*  $\Delta S_{\text{плав.}} = 154 \text{ Дж/К} = 0,154 \text{ кДж/К.}$

Приклад 5. Реакція горіння метану визначається за рівнянням:



Визначити теплоту утворення метану, якщо відомі значення теплот утворення  $CO_2$  та  $H_2O$  (табличні данні).

*Розв'язання:* Треба визначити тепловий ефект реакції, термохімічне рівняння якої має вигляд:  $C(\text{графіт}) + 2H_2(g) = CH_4(g) \quad \Delta H_{x.p.} = ?$

Використовуємо наступні дані:

$$\begin{aligned} 1) \quad CH_4(g) + 2O_2(g) &= CO_2(g) + 2H_2O(p) & \Delta H_{x.p.} &= -890,2 \text{ кДж} \\ 2) \quad C(\text{графіт}) + O_2(g) &= CO_2(g) & \Delta H_{x.p.} &= -393,5 \text{ кДж} \\ 3) \quad H_2(g) + 1/2 O_2 &= H_2O(p) & \Delta H_{x.p.} &= -285,8 \text{ кДж} \end{aligned}$$

Із термохімічними рівняннями можна поводитися як з алгебраїчними: рівняння (3) помножити на 2, а потім суму (2) і (3) рівнянь вилучити з рівняння (1):

$$\begin{aligned} CH_4(g) + 2O_2(g) - C(\text{графіт}) - 2H_2(g) - 2O_2(g) &= CO_2(g) + 2H_2O(p) - CO_2(g) - 2H_2O(p) \\ \Delta H_{x.p.} = -890,2 + 393,5 + 571,6 &= 74,9 \text{ кДж/моль} \\ C(\text{графіт}) + 2H_2(g) &= CH_4(g) \quad \Delta H_{x.p.} = 74,9 \text{ кДж/моль} \end{aligned}$$

Оскільки теплота утворення дорівнює теплоті розкладу з протилежним знаком, то  $\Delta H_{\text{утв.}} = -\Delta H_{\text{розкл.}}$ ;  $\Delta H_{\text{утв.}}(CH_4) = -74,9 \text{ кДж/моль}$

Такий самий результат можна отримати :

$$\begin{aligned} \Delta H_{x.p.} &= \Delta H(CO_2) + 2\Delta H(H_2O) - \Delta H(CH_4) - 2\Delta H(O_2) \\ \Delta H(CH_4) &= \Delta H_{x.p.} - \Delta H(CO_2) - 2\Delta H(H_2O) = -890,0 + 393,5 + 2 \cdot 285,6 = -74,9 \text{ кДж} \\ \text{Відповідь: } \Delta H_{\text{утв.}}(CH_4) &= -74,9 \text{ кДж.} \end{aligned}$$

### **3.2. Хімічна кінетика. Швидкість хімічних реакцій**

*Хімічна кінетика* – це наука, що вивчає швидкість хімічних реакцій та їх механізм. ([1] С.174 - 198 , [5] С.110 – 121)

#### **3.2.1 Закон діючих мас ([1] С.176, [5] С.111)**

Вплив температури на швидкість хімічної реакції [2] С.179, [3] С.113.


#### **3.2.2 Хімічна рівновага ([1] С.188- 109, [5] С.117- 119)**

#### **3.2.3 Зміщення хімічної рівноваги . Принцип Ле-Шательє ([1] С.190- 199, [5] С.119- 121)**

#### **3.2.4 Приклади розв'язання завдань**

Приклад 1. В гомогенній системі  $2NO_{(e)} + O_{2(e)} \rightleftharpoons 2NO_{2(e)}$  рівноважні концентрація реагуючих речовин при сталій температурі становить  $[NO] = 0,4$  моль/дм<sup>3</sup>,  $[O_2] = 0,2$  моль/дм<sup>3</sup>,  $[NO_2] = 1,2$  моль/дм<sup>3</sup>. Визначити константу рівноваги та концентрації вихідних речовин.

*Розв'язання:* Для наведеної системи:



вираз для константи рівноваги має вигляд:

$$K_p = \frac{[NO_2]^2}{[NO]^2 \cdot [O_2]} = \frac{1,2^2}{0,4^2 \cdot 0,2} = \frac{1,44}{0,16 \cdot 0,2} = 45.$$

За рівнянням 2 моль  $NO$  реагує з 1 моль  $O_2$  та утворюється 2 моль  $NO_2$ . На утворення 1,2 моль  $NO_2$  витрачено 1,2 моль  $NO$  та 0,6 моль  $O_2$  тоді

$$C_{\text{вих}}(NO) = [NO] + 1,2 = 0,4 + 1,2 = 1,6 \text{ моль/дм}^3$$

$$C_{\text{вих}}(O_2) = [O_2] + 0,6 = 0,2 + 0,6 = 0,8 \text{ моль/дм}^3$$

Приклад 2. Визначити як зміниться швидкість прямої та зворотної реакції в системі, якщо тиск зменшиться у 2 рази:  $CO_2(g) + C(m) = 2CO(g)$

*Розв'язання:* Згідно з законом діючих мас, швидкості реакцій в гетерогенній системі становлять:

$$v_{np} = \vec{K}[CO_2] \text{ const} = K'[CO_2] \quad v_{sp} = \vec{K}[CO]^2$$

Якщо тиск зменшиться у 2 рази (використовуємо тиск ( $P$ ) замість концентрації ( $C$ )), а вирази для швидкостей будуть мати вигляд:

$$v'_{np} = \vec{K}'[1/2 CO_2] = 1/2 \vec{K}'[CO_2] \quad v'_{sp} = \vec{K}'[1/2 CO]^2 = 1/4 \vec{K}'[CO]^2$$

Співвідношення  $v'_{\text{пр}}/v_{\text{пр}} = 1/2K'[CO_2] / K'[CO_2] = 1/2$ , вказує, що швидкість прямої реакції зменшиться у 2 рази.

Співвідношення  $v'_{\text{зв}}/v_{\text{зв}} = 1/4K[CO_2]^2 / K[CO_2]^2 = 1/4$ , вказує, що швидкість зворотної реакції зменшиться у 4 рази.

Приклад 3. Визначити як зміниться швидкість реакції в гомогенній системі при зниженні температури з  $90^{\circ}\text{C}$  до  $60^{\circ}\text{C}$ , якщо  $\gamma = 3$ .

*Розв'язання:* Згідно з правилом Вант-Гоффа :

$$v_2 = v_1 \cdot \gamma^{\frac{T_2 - T_1}{10}},$$

де  $v_2$ ,  $v_1$  – швидкості реакцій за температурах  $T_1$  та  $T_2$ ,  $\Delta T$  – зміна температури.

$$v_2 = v_1 \cdot 3^{\frac{60-90}{10}}, \quad v_2 = v_1 \cdot 3^{\frac{-30}{10}}, \quad v_2 = v_1 \cdot 3^{-3} = 1/9 v_1$$

*Відповідь:* швидкість реакції зменшиться у 9 разів.

Приклад 4. Як зміниться напрямок хімічної рівноваги в системі якщо:  $P \downarrow$ ,  $T \uparrow$ ,  $C_3 \uparrow$ ; або  $P \uparrow$ ,  $T \downarrow$ ,  $C_3 \downarrow$ .



*Розв'язання:* Для виявлення впливу температури на зсув рівноваги в системі визначаємо за  $\Delta H$ , що прямий процес – ендотермічний, а зворотній – екзотермічний.

При підвищенні температури за принципом Ле-Шательє рівновага зміщується в напрямку зворотного процесу, тобто  $T \uparrow \rightarrow$ , а при  $T \downarrow \leftarrow$ .

Для визначення дії тиску на рівновагу, рахуємо кількість моль газоподібних речовин до та після реакції: 3 та 2 відповідно. При зміні тиску рівновага в системі зміщується :  $P \uparrow \rightarrow$  (менша кількість моль газів),  $P \downarrow \leftarrow$  (більша кількість газоподібних сполук)

Якщо змінюється кількість третьої речовини -  $CO_2$ , то зміщення рівноваги відбудеться в протилежному напрямку:  $[CO_2] \uparrow \leftarrow$ ,  $[CO_2] \downarrow \rightarrow$ .

#### Розділ 4. РОЗЧИНИ

Після вивчення матеріалу цього розділу студенти *повинні* знати: які системи називаються розчинами, що є основою якісних та кількісних методів визначення складу розчинів, основні положення сольватної теорії Д.І. Менделєєва; класифікацію розчинів за способом їх складу та фізико-хімічні величини, які необхідно при цьому використовувати; вміти визначати способи виразу концентрації розчинів, а також робити перерахунки з одної концентрації на іншу. Мати уявлення про сильні та слабкі електроліти, дисоціацію, константи та ступені дисоціації; уявляти собі що таке кислоти, основи та солі за теорією електролітичної дисоціації;

що таке водневий показник, вміти писати рівняння гідролізу солей.  
([2] С. 217 - 270, [3] С.123 - 177)

**4.1. Способи визначення складу розчинів** ([1] С.219-220, [5] С.147-149)

**4.2 Колігативні властивості розведених розчинів** ([1] С.228-237,  
[5] С.149-156)

**4.3 Водні розчини електролітів** ([1] С.237- 258, [5] С.158 - 171)

**4.3.1 Сильні електроліти** ([1] С.246- 255, [5] С.160- 161)

**4.3.2 Йонний добуток води. Водневий показник** ([1] С.259,  
[5] С.164-161)

**4.3.2 Гідроліз солей** ([1] С.264 - 270, [5] С.171 - 173)

#### 4.4 Приклади розв'язання завдань

**Приклад 1.** Розчин виготовлено з 32 г  $AlCl_3$  та 168 г (розчинника) води. Густина розчину  $1,15 \text{ г/см}^3$ . Визначити масові та об'ємні концентрації.

**Розв'язання:** Масові концентрації – це масова частка ( $\omega$ ) та моляльна концентрація ( $C_m$ ). Визначити  $\omega$  можливо за формулою:

$$\omega = \frac{m_{\text{p-ни}}}{m_{\text{p-ну}}} = \frac{m_{\text{p-ни}}}{m_{\text{p-ни}} + m_{\text{p-ка}}}; \quad \omega = \frac{m_{\text{p-ни}}}{\rho \cdot V}$$

де  $\omega$  – масова частка розчиненої речовини;  $m_{\text{p-ни}}$  – маса розчиненої речовини;  $m_{\text{p-ну}}$  – загальна маса розчину;  $m_{\text{p-ка}}$  – маса розчинника;  $\rho$  – густина розчину,  $\text{г/см}^3$ ;  $V$  – об'єм розчину.

$$\omega = \frac{m_{\text{p-ни}}}{m_{\text{p-ни}} + m_{\text{p-ка}}} = \frac{32}{32 + 168} = \frac{32}{200} = 0,16 \text{ або } 16\%$$

Моляльна концентрація дорівнює:

$$C_m = \frac{V_{\text{p-ни}}}{m_{\text{p-ка}}}; \quad C_m = \frac{m_{\text{p-ни}} \cdot 1000}{M \cdot m_{\text{p-ка}}},$$

де  $m_{\text{p-ни}}$  і  $m_{\text{p-ка}}$  – маса розчиненої речовини і розчинника;  $M$  – молярна маса розчиненої речовини. Одиниця виміру моляльності – **моль/кг**.

$$M(AlCl_3) = 27 + 3 \cdot 35,5 = 133,5 \text{ г/моль}$$

$$C_m = \frac{32 \cdot 1000}{133,5 \cdot 168} = 1,427 \text{ моль/кг.}$$

Об'ємні концентрації – це молярна ( $C_M$ ), молярна еквівалента (стара назва – нормальна концентрація,  $C_H$ ) ( $C_{\text{Мекв}}$ ) та титр ( $T$ ) розчину.

$$C_M = \frac{V_{\text{p-ни}}}{V_{\text{p-ну}}}; \quad C_M = \frac{m_{\text{p-ни}}}{M_{\text{p-ни}} \cdot V_{\text{p-ну}}}$$

$$C_H = C_{M\text{ екв}} = \frac{V_{\text{екв} p\text{-ні}}}{{V}_{p\text{-ні}}}; \quad C_{M\text{ екв}} = \frac{m_{p\text{-ні}}}{{M}_{\text{екв} p\text{-ні}} \cdot {V}_{p\text{-ні}}}$$

$$T = \frac{m_{p\text{-ні}}}{{V}_{p\text{-ні}}}; \quad T = \frac{C_{M\text{ екв}} \cdot M_{\text{екв}}}{1000}; \quad T = \frac{C_M \cdot M}{1000}$$

Треба визначити об'єм розчину, який дорівнює:

$$V = \frac{m_{p\text{-ні}}}{\rho}.$$

Тоді:

$$C_M = \frac{m_{p\text{-ні}} \cdot \rho}{{M}_{p\text{-ні}} \cdot m_{p\text{-на}}} = \frac{32 \cdot 1,15 \cdot 10^3}{133,5 \cdot 200} = 1,38 \text{ моль/дм}^3$$

$$C_{M\text{ екв}} = \frac{m_{p\text{-ні}} \cdot \rho}{f_{\text{екв}} \cdot M_{p\text{-ні}} \cdot m_{p\text{-на}}} = \frac{32 \cdot 1,15 \cdot 10^3}{\frac{1}{3} \cdot 133,5 \cdot 200} = 4,14 \text{ моль/дм}^3$$

або

$$C_{M\text{ екв}} = \frac{1}{f_{\text{екв}} \cdot C_M} = 3 \cdot C_M = 3 \cdot 1,38 = 4,14 \text{ моль/дм}^3$$

$$T = \frac{C_M \cdot M}{1000} = \frac{1,38 \cdot 133,5}{1000} = 0,184 \text{ г/см}^3$$

*Відповідь.* Масові концентрації:  $\omega = 0,16$ ;  $C_m = 1,427 \text{ моль/кг}$ ;  
об'ємні:  $C_M = 1,38 \text{ моль/дм}^3$ ;  $C_{M\text{ екв}} = 4,14 \text{ моль/дм}^3$ ;  $T = 0,184 \text{ г/см}^3$ .

Приклад 2. Яку масу соди  $Na_2CO_3$  треба взяти для приготування  $250 \text{ см}^3$   $0,25 \text{ М}$  розчину?

*Розв'язання:* Визначаємо кількість речовини  $Na_2CO_3$ , яка міститься у  $250 \text{ см}^3$  або  $0,25 \text{ дм}^3$ :

$$v(Na_2CO_3) = C_M V = 0,25 \text{ моль/дм}^3 \cdot 0,25 \text{ дм}^3 = 0,0625 \text{ моль}$$

Масу  $Na_2CO_3$ , необхідну для приготування розчину обчислимо:

$$m(Na_2CO_3) = v \cdot M = 0,0625 \text{ моль} \cdot 106 \text{ г/моль} = 6,625 \text{ г};$$

де  $M(Na_2CO_3) = 106 \text{ г/моль}$ .

*Відповідь.* Для виготовлення  $250 \text{ см}^3$   $0,25 \text{ М}$  розчину треба взяти наважку соди (карбоната натрію) масою 6,625 г.

Приклад 3. Сірководень об'ємом  $14 \text{ см}^3$  розчинили у воді масою 500 г (н.у.). Обчислить масову частку сірководню в розчині.

*Розв'язання.* Визначаємо кількість речовини сірководню, розчиненого у воді:

$$v(H_2S) = \frac{V(H_2S)}{V_m} = \frac{0,014}{22,4} = 0,000625 \text{ моль.}$$

Маса розчиненого сірководню дорівнює:

$$m(H_2S) = v(H_2S) \cdot M(H_2S) = 0,000625 \cdot 34 = 0,02125 \text{ г},$$

де  $M(H_2S) = 34 \text{ г/моль}$

Маса розчину дорівнює:

$$m_{\text{розн}} = m(H_2O) + m(H_2S) = 500 + 0,02125 \approx 500,02 \text{ г}$$


Масова частка сірководню в цьому розчині дорівнює:

$$\omega = \frac{m_{\text{п-ну}}}{m_{\text{п-ну}}} = \frac{0,02125}{500,02} = 0,424 \cdot 10^{-4} \text{ або } 0,424 \cdot 10^{-2\%} = 4,24 \cdot 10^{-3\%}$$

*Відповідь.* Масова частка  $H_2S$  у розчині  $0,424 \cdot 10^{-4}$ .

Приклад 4. Який об'єм води та розчину хлоридної кислоти з масовою часткою 20 % та густинорою  $1,1 \text{ г/см}^3$  треба взяти, щоб приготувати 250 г розчину з масовою часткою  $HCl$  2%.

*Розв'язання:* Вирішити це завдання можна скориставшись діагональною схемою або «правилом хреста». В лівий верхній кут треба помістити вищу концентрацію (20), у нижній лівий – меншу концентрацію (0 для розчинника  $H_2O$ ), в центрі – концентрацію яку готовують:



Числа **2**, **18** одержано при відніманні по діагоналі від більшого числа менше ( $20 - 2 = 18$ ;  $2 - 0 = 2$ ) і вказують у якому масовому співвідношенні слід змішувати початковий розчин кислоти і воду:  $2 : 18 = 1 : 9$ .

Для одержання 250 г 2% розчину треба змішати:

$$m(HCl) = 250 \cdot \frac{1}{1+9} = 25 \text{ г}; \quad V(HCl) = \frac{m}{\rho} = \frac{25}{1,1} = 22,7 \text{ см}^3;$$

$$m(H_2O) = 250 \cdot \frac{9}{1+9} = 225 \text{ г}; \quad V(H_2O) = \frac{225}{1,0} = 225 \text{ см}^3.$$

*Відповідь.* Для приготування 250 г 2% розчину  $HCl$  треба  $22,7 \text{ см}^3$   $HCl$  та  $225 \text{ см}^3$  води ( $H_2O$ ).

Приклад 5. Приготувати  $200 \text{ см}^3$  0,1 М розчину сульфату міді з кристалогідрату  $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ .

*Розв'язання.* Визначаємо масу безводної солі:

$$m(CuSO_4) = M(CuSO_4) \cdot C_M \cdot V = 159,5 \cdot 0,1 \cdot 0,2 = 3,19 \text{ г.}$$

Знаходимо масу кристалогідрату  $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ , відповідну безводній солі:

$$\begin{array}{l} 1 \text{ моль } CuSO_4 \cdot 5H_2O \text{ містить } 1 \text{ моль } CuSO_4 \\ 249,5 \text{ г } CuSO_4 \cdot 5H_2O \quad - \quad 159,5 \text{ г } CuSO_4 \\ m \text{ г } CuSO_4 \cdot 5H_2O \quad - \quad 3,19 \text{ г } CuSO_4 \\ m (CuSO_4 \cdot 5H_2O) = (249,5 \cdot 3,19)/159,5 = 4,98 \text{ г.} \end{array}$$

*Відповідь.* Для приготування  $200 \text{ см}^3$  0,1 М розчину сульфату міді треба 4,98 г  $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ .

### **Розчини сильних електролітів**

Приклад 1. Осмотичний тиск 0,1 н  $ZnSO_4$  при  $0^\circ\text{C}$  дорівнює  $1,59 \cdot 10^5$  Па. Визначити ізотонічний коефіцієнт цього розчину.

*Розв'язання.* Осмотичний тиск розчинів електролітів дорівнює:

$$p_{osm} = i \cdot C_M \cdot RT$$

Ізотонічний коефіцієнт:

$$i = \frac{p_{osm}}{C_M \cdot R \cdot T} = \frac{1,59 \cdot 10^2 \text{ кПа}}{\frac{1}{2} \cdot 0,1 \cdot 8,314 \cdot 273} = 1,4$$

*Відповідь:* ізотонічний коефіцієнт дорівнює 1,4.

Приклад 2. Тиск водяної пари над розчином 24,8 г  $KCl$  у 100 г води при  $100^\circ\text{C}$  дорівнює  $9,14 \cdot 10^4$  Па. Обчисліть ізотонічний коефіцієнт, якщо тиск водяної пари при цій температурі дорівнює  $1,0133 \cdot 10^5$  Па.

*Розв'язання:* Перший закон Рауля для електролітів:

$$\frac{p_0 - p}{p_0} = N_B; \quad \frac{\Delta p}{p_0} = i \cdot \frac{v_B}{v_A + v_B}$$

Кількість речовини  $KCl$  та води визначаємо:

$$\begin{aligned} v_B &= \frac{m}{M} \\ v(KCl) &= \frac{24,8}{74,5} = 0,33 \text{ моль,} \end{aligned}$$

де  $M(KCl) = 39 + 35,5 = 74,5$  г/моль

$$v(H_2O) = \frac{100}{18} = 5,55 \text{ моль,}$$

де  $M(H_2O) = 2 + 16 = 18$  г/моль

Ізотонічний коефіцієнт дорівнює:

$$i = \frac{(p_0 - p) \cdot (v_A + v_B)}{p_0 \cdot v_B} = \frac{(1,0133 \cdot 10^5 - 9,14 \cdot 10^4) \cdot (0,33 + 5,55)}{1,0133 \cdot 10^5 \cdot 0,33} = 1,75.$$

*Відповідь* ізотонічний коефіцієнт дорівнює 1,75.

Приклад 3. Розчин, який містить 8 г  $NaOH$  у 1000 г води, кипить при  $100,184^{\circ}C$ . Обчисліть ізотонічний коефіцієнт (для  $H_2O$   $E = 0,516$ )

*Розв'язання.* Другий закон Рауля для електролітів має вигляд:

$$\Delta T_{\text{кун}} = i \cdot E \cdot C_m; \quad \Delta T_{\text{зам}} = i \cdot K \cdot C_m;$$

де  $C_m$  – моляльна концентрація;

$$C_m = \frac{v_{p-hu}}{m_{p-ка}} = \frac{m_{p-hu} \cdot 1000}{M \cdot m_{p-ка}},$$

$$\Delta T_{\text{кун}} = \frac{i \cdot E \cdot m_{p-hu} \cdot 10^3}{M \cdot m_{p-ка}};$$

звідси:

$$i = \frac{\Delta T_{\text{кун}} \cdot M \cdot m_{p-ка}}{E \cdot m_{p-hu} \cdot 10^3} = \frac{0,184 \cdot 40 \cdot 1000}{0,516 \cdot 8 \cdot 10^3} = 1,78.$$

*Відповідь* ізотонічний коефіцієнт дорівнює 1,78.

Приклад 4. Обчисліть йонну силу розчину  $K_2SO_4$ , що має концентрацію 0,02 моль на 1000 г  $H_2O$ .

*Розв'язання:* Йонна сила розчину дорівнює:

$$I = 1/2 \cdot (C_1 Z_1^2 + C_2 Z_2^2 + \dots + C_i Z_i^2)$$

$$I(K_2SO_4) = 1/2[C_K^+(Z_K^+)^2 + C(SO_4^{2-})(Z(SO_4^{2-}))^2] = 1/2[0,02 \cdot 2 \cdot 1^2 + 0,02 \cdot 1 \cdot |-2|^2] = 0,06$$

*Відповідь:* йонна сила розчину дорівнює 0,06.

### **Розчини слабких електролітів**

Приклад 1. Обчисліть ступінь дисоціації сірководневої кислоти за першим ступенем у 0,1М розчині, якщо константа дисоціації  $K_d = 1,1 \cdot 10^{-7}$ .

*Розв'язання.*  $H_2S$  дуже слабка кислота, тому використовуємо спрощене рівняння закону розділення Оствальда:

$$\alpha = \sqrt{\frac{K_{\text{дис}}}{C_M}} = \sqrt{\frac{1,1 \cdot 10^{-7}}{0,1}} = 1,05 \cdot 10^{-3}$$

*Відповідь:* ступінь дисоціації  $H_2S$  за 1 ступенем дорівнює 0,105 %.

Приклад 2. Обчисліти концентрацію йонів  $OH^-$  в 0,01 М розчині  $NH_4OH$ , якщо  $K_{\text{дис.}} = 1,77 \cdot 10^{-5}$ .

*Розв'язання.* Концентрація йонів у розчині електроліту залежить від молярної концентрації електроліту, його ступеня дисоціації та кількості йонів даного типу, що утворюються, тобто:

$$C_{ion} = C \alpha n.$$

Для визначення концентрації йонів  $OH^-$  у розчині  $NH_4OH$  знаходимо ступінь дисоціації  $NH_4OH$ :

$$\alpha = \sqrt{\frac{K_{disc}}{C_M}} = \sqrt{\frac{1,77 \cdot 10^{-5}}{0,01}} = 0,42 \cdot 10^{-1} = 0,042$$

Концентрація йонів  $OH^-$  дорівнює:

$$C(OH^-) = 0,01 \cdot 0,042 \cdot 1 = 0,42 \cdot 10^{-3} \text{ моль/дм}^3.$$

Відповідь: концентрація іонів  $OH^-$  складає  $0,42 \cdot 10^{-3}$  моль/дм<sup>3</sup>

#### **4.5 Завдання до виконання контрольної роботи з модуля 1 (теоретичного)**

**1 а.** Розв'язати задачу та сформулювати закони, які були використані при розв'язку Об'єм ацетилену (етину) за н.у. становить  $0,030 \text{ м}^3$ . Розрахувати об'єм при  $T = 339 \text{ К}$ , та  $P = 96989 \text{ Па}$ ; масу цього газу, його молярний об'єм; абсолютну масу його молекул; кількість речовини даного об'єму газу.

**6.** З наведених електронних формул визначити валентні електрони та дати їм характеристику за допомогою 4-х квантових чисел. Визначити місце елементів в періодичній системі (період, група, підгрупа, порядковий номер), вказати фізичний зміст номера періоду;  $5p^6 6s^2 5d^3$ ,  $4p^6 5s^2 4d^{10}$

**в.** Сформулювати закон Рауля для розчинів неелектролітів. Визначити температури кристалізації та кипіння 2%-ого водного розчину глукози  $C_6H_{12}O_6$ .

**2 а.** Розв'язати задачу та сформулювати закони, які були використані при розв'язку. Об'єм бутену за н.у. становить  $0,084 \text{ м}^3$ . Розрахувати об'єм при  $T = 328 \text{ К}$ , та  $P = 101156 \text{ Па}$ ; кількість молекул, що міститься в даному об'ємі; відносну густину газу за воднем та за повітрям.

**2 б.** Записати електронні формули атомів, вказати валентні електрони та до якої родини належать елементи. Визначити місце елементів в періодичній системі (період, група, підгрупа, порядковий номер), вказати фізичний зміст номера групи: *As*, *Te*.

**2 в.** Сформулювати закон Рауля для розчинів неелектролітів Розчин, який містить 1,22 г бензойної кислоти  $C_6H_5COOH$  у 100 г сірковуглецю  $CS_2$ , кипить при  $46,53^\circ\text{C}$ . Температура кипіння  $CS_2 = 46,3^\circ\text{C}$ . Визначити ебуліоскопічну константу  $CS_2$ .

**3 а.** Розв'язати задачу та сформулювати закони, які були використані при розв'язку. Об'єм газоподібного Флуору за н.у. становить  $0,036 \text{ м}^3$ . Розрахувати об'єм при  $T = 289 \text{ К}$ , та  $P = 103580 \text{ Па}$ ; масу цього газу, двома способами, кількість молекул, що міститься в даному об'ємі.

**3 б.** Записати електронні формули атомів, вказати валентні електрони та до якої родини вони належать. Визначити місце елементів в періодичній системі (період, група, підгрупа, порядковий номер), вказати фізичний зміст порядкового номера елемента: *Al*, *O*.

**3 в.** Сформулювати закон Рауля для розчинів неелектролітів Температура кристалізації розчину, який містить 11,04 г гліцерину у 800 г води дорівнює  $-0,279^{\circ}\text{C}$ . Визначити молекулярну масу гліцерину.

**4 а.** Розв'язати задачу та сформулювати закони, які були використані при розв'язку Об'єм газоподібного  $\text{CH}_3\text{Cl}$  за н.у. становить  $0,046 \text{ m}^3$ . Розрахувати об'єм при  $T = 295 \text{ K}$ , та  $P = 10199 \text{ Pa}$ ; масу цього газу, кількість молекул, що міститься в даному об'ємі.

**4 б.** Записати електронні формули атомів, згідно правилам Клечківського підтвердити порядок заповнення енергетичних рівнів та підрівнів, вказати валентні електрони. Визначити місце елементів в періодичній системі (період, група, підгрупа, порядковий номер), вказати фізичний зміст порядкового номера елемента: *Cl*, *B*.

**4 в.** Сформулювати закон Рауля для розчинів неелектролітів Розчин, який містить 0,512 г неелектроліту у 100 г бензену, має  $t_{\text{зам}} = 5,296^{\circ}\text{C}$ . Для бензену вона дорівнює  $5,5^{\circ}\text{C}$ . Кріоскопічна константа дорівнює  $5,1^{\circ}$ . Визначити молярну масу розчиненої речовини.

**5 а.** Розв'язати задачу та сформулювати закони, які були використані при розв'язку Об'єм оксиду Сульфуру (IV) за н.у. становить  $0,064 \text{ m}^3$ . Розрахувати об'єм при  $T = 398 \text{ K}$ , та  $P = 101470 \text{ Pa}$ ; масу цього газу, кількість речовини даного об'єму газу.

**5 б.** З наведених електронних формул визначити валентні електрони та дати їм характеристику за допомогою 4-х квантових чисел. Визначити місце елементів в періодичній системі (період, група, підгрупа, порядковий номер), чи відрізняються елементи головних та побічних підгруп:  $3p^64s^23d^3$ ;  $5s^24d^{10}5p^3$ .

**5 в.** Сформулювати закон Рауля для розчинів неелектролітів Визначити масову частку водного розчину сахарози  $C_{12}H_{22}O_{11}$ , якщо  $t_{\text{зам}} \text{ розчину} = -0,93^{\circ}\text{C}$ . Кріоскопічна константа води  $= 1,86^{\circ}$ .

**6 а.** Розв'язати задачу та сформулювати закони, які були використані при розв'язку. Об'єм оксиду Карбону (II) за н.у. становить  $0,036 \text{ m}^3$ . Розрахувати об'єм при  $T = 354 \text{ K}$ , та  $P = 101010 \text{ Pa}$ ; масу цього газу двома способами, кількість речовини даного об'єму газу.

**6 б.** Записати електронні формули атомів, вказати валентні електрони та записати формули атомів у збудженному стані, вказати їх валентність. Визначити місце елементів в періодичній системі (період, група, підгрупа, порядковий номер), вказати фізичний зміст номера групи: *N*, *Mn*.

**6 в.** Що таке осмотичний тиск? Який з розчинів за однакових об'ємів з однаковою масою розчиненої речовини та за однакових умов має більший осмотичний тиск: нафталін  $C_{10}H_8$  або антрацен  $C_{14}H_{10}$ ?

**7а.** Розв'язати задачу та сформулювати закони, які були використані при розв'язку. Об'єм сірководню за н.у. становить  $0,015 \text{ м}^3$ . Розрахувати об'єм при  $T = 396 \text{ К}$ , та  $P = 101050 \text{ Па}$ ; кількість молекул, що міститься в даному об'ємі; відносну густину газу за воднем та за повітрям.

**7 б.** З наведених електронних формул визначити валентні електрони та визначити місце елементів в періодичній системі (період, група, підгрупа, порядковий номер), чим відрізняються елементи головних та побічних підгруп:  $3p^64s^23d^6$ ,  $5s^24d^{10}5p^3$ .

**7 в.** Що таке осмотичний тиск, від яких факторів він залежить. Визначити осмотичний тиск розчину який містить 270 г глюкози  $C_6H_{12}O_6$  у  $3 \text{ дм}^3$  води при  $0^\circ\text{C}$ .

**8 а.** Розв'язати задачу та сформулювати закони, які були використані при розв'язку. Об'єм оксиду Нітрогену (II) за н.у. становить  $0,059 \text{ м}^3$ . Розрахувати об'єм при  $T = 347 \text{ К}$ , та  $P = 101500 \text{ Па}$ ; масу цього газу, молярний об'єм за умов, що задані; кількість речовини даного об'єму газу.

**8 б.** Записати електронні формули атомів, вказати валентні електрони та записати формули атомів у збудженному стані, вказати їх валентність. Визначити місце елементів в періодичній системі (період, група, підгрупа, порядковий номер), вказати фізичний зміст номера періоду:  $Na$ ,  $I$ .

**8 в.** Що таке осмотичний тиск, від яких факторів він залежить . За якої температури осмотичний тиск розчину який містить 45 г глюкози  $C_6H_{12}O_6$  у  $1 \text{ дм}^3$  буде дорівнювати 607,8 кПа?

**9 а.** Розв'язати задачу та сформулювати закони, які були використані при розв'язку. Об'єм оксиду Карбону (IV) за н.у. становить  $0,046 \text{ м}^3$ . Розрахувати об'єм при  $T = 386 \text{ К}$ , та  $P = 112010 \text{ Па}$ ; масу цього газу двома способами, кількість речовини даного об'єму газу.

**9 б.** Записати електронні формули атомів, згідно правилам Клечківського підтвердити порядок заповнення енергетичних рівнів та підрівнів, вказати валентні електрони елементів. Записати електронні формули йонів цих атомів. Визначити місце елементів в періодичній системі, що об'єднує елементи головних та побічних підгруп:  $Ge$ ,  $Ti$ .

**9 в.** Що таке осмотичний тиск, від яких факторів він залежить . У  $400 \text{ см}^3$  розчину міститься 2 г розчиненої речовини при  $27^\circ\text{C}$ . Осмотичний тиск розчину  $1,216 \cdot 10^5 \text{ Па}$ . Визначити молярну масу розчиненої речовини.

**10 а.** Розв'язати задачу та сформулювати закони, які були використані при розв'язку. Об'єм фосфіну ( $PH_3$ ) за н.у. становить  $0,015 \text{ м}^3$ . Розрахувати

об'єм при  $T = 390$  К, та  $P = 101055$  Па; кількість молекул, що міститься в даному об'ємі; відносну густину газу за воднем та за повітрям.



**10 б.** Записати електронні формули атомів, вказати валентні електрони та до якої родини належать елементи. Записати формули атомів у збудженному стані, вказати їх валентність. Визначити місце елементів в періодичній системі (період, група, підгрупа, порядковий номер), вказати фізичний зміст номера групи:  $Mg$ ,  $V$ .

**10 в.** Що таке осмотичний тиск, від яких факторів він залежить В  $1\text{dm}^3$   $0,01\text{n}$  розчину ацетатної кислоти міститься  $6,26 \cdot 10^{21}$  її молекул та іонів. Визначити ізотонічний коефіцієнт та ступінь іонізації  $\text{CH}_3\text{COOH}$  у розчині.

#### **4.6 Завдання до виконання контрольної роботи з модуля 2 (практичного)**


**11 а.** З  $1,35$  г оксиду металу одержали  $3,15$  г його нітрату. Визначити молярну масу еквіваленту металу.

**11 б.** Скласти формули комплексних сполук А і Б з їх частинок та записати можливі рівняння реакції їх утворення, дати назви. Вказати назви та заряди усіх складових частин комплексної сполуки. Вказати хімічні зв'язки в сполуках та просторову будову цих комплексних сполук:





**12 а.** Обчислити фактори еквівалентності та молярні маси еквівалентів речовин:  $\text{Ca(OH)}_2$ ;  $\text{CaHPO}_4$ ;  $\text{H}_2\text{O}$ .

**12 б.** Скласти формули комплексних сполук А і Б з їх частинок та дати назви. Записати рівняння дисоціації комплексних сполук та вирази константи нестійкості комплексних іонів. Вказати хімічні зв'язки в сполуках та просторову будову цих комплексних сполук:



**13 а.** Розрахувати молярну масу еквіваленту металу, якщо при відновлені  $1,017$  г його оксиду витрачено  $0,28 \text{ dm}^3$  водню (н.у.).



**13 б.** Дати назву комплексним сполукам А і Б, написати рівняння дисоціації А і Б, молекулярні та іонні рівняння реакцій обміну між комплексом та сіллю. Вказати хімічні зв'язки в сполуках та просторову будову цих сполук.



**14 а.** На спалювання  $1,5$  г двовалентного металу потрібно  $0,69 \text{ dm}^3$  кисню (н.у.). Чому дорівнює молярна маса еквівалента та атомна маса цього  $Me$ .


**14 б.** Дати назву комплексним сполукам А і Б, написати рівняння дисоціації А і Б, молекулярні та іонні рівняння реакцій обміну між

комплексом та сіллю. Вказати хімічні зв'язки в сполуках та просторову будову цих сполук.





**15 а.** Обчислити фактори еквівалентності та молярні маси еквівалентів речовин:  $Fe(OH)_2$ ;  $Na_2HPO_4$ ;  $CuO$ .

**15 б.** Дати назву комплексним сполукам А і Б, написати рівняння дисоціації А і Б, молекулярні та йонні рівняння реакцій обміну між комплексом та сіллю. Вказати хімічні зв'язки в сполуках та просторову будову цих сполук.





**16 а.** З 3,31 г нітрату металу отримали 2,78 г його хлориду. Визначити молярну масу еквіваленту металу.

**16 б** Дати назву комплексним сполукам А і Б, написати рівняння дисоціації А і Б, молекулярні та йонні рівняння реакцій обміну між комплексом та сіллю. Вказати хімічні зв'язки в сполуках та просторову будову цих сполук.




**17 а.** Обчислити фактори еквівалентності та молярні маси еквівалентів речовин:  $Fe(OH)_2Cl$ ;  $NaH_2PO_4$ ;  $CuSO_4$ .

**17 б.** Дати назву комплексним сполукам А і Б, написати рівняння дисоціації А і Б, молекулярні та йонні рівняння реакцій обміну між комплексом та сіллю. Вказати хімічні зв'язки в сполуках та просторову будову цих сполук.





**18 а.** Вміст хлору у 10,3 г хлориду титана складає 7,1 г. Визначити молярну масу еквівалента та валентність титану. Складіть формулу сполуки.

**18 б.** Дати назву комплексним сполукам А і Б, написати рівняння дисоціації А і Б, молекулярні та йонні рівняння реакцій обміну між комплексом та сіллю. Вказати хімічні зв'язки в сполуках та просторову будову цих сполук.




**19 а.** Обчислити фактори еквівалентності та молярні маси еквівалентів реагуючих речовин:  $Ca(OH)_2 + H_3PO_4 = CaHPO_4 + 2H_2O$ .

**19 б.** Дати назву комплексним сполукам А і Б, написати рівняння дисоціації А і Б, молекулярні та йонні рівняння реакцій обміну між комплексом та сіллю. Вказати хімічні зв'язки в сполуках та просторову будову цих сполук.




**20 а.** Молярна маса фосфату тривалентного металу 342 г/моль. Яка формула солі, якщо молярна маса еквівалента фосфату металу 57 г/моль.

**20 б.** Дати назву комплексним сполукам А і Б, написати рівняння дисоціації А і Б, молекулярні та йонні рівняння реакцій обміну між комплексом та сіллю. Вказати хімічні зв'язки в сполуках та просторову будову цих сполук.



#### 4.7 Завдання до виконання контрольної роботи з модуля 3 (практичного)

**21 а.** Складіть рівняння хімічної реакції та визначте тепловий ефект за стандартних умов, враховуючи, що отримано 0,18 кг  $H_2O$ . Який це процес за напрямком та обміном теплотою? При якій температурі відбудеться обернена реакція; система буде знаходитися у стані рівноваги?



**21 б.** Визначить швидкість прямої та зворотної реакцій та записати вирази для константи рівноваги цих процесів. Як зміниться рівновага якщо  $C\uparrow, T\uparrow, P\uparrow$ . Які умови потрібні для збільшення виходу продуктів реакцій:





**21 в.** До 100 см<sup>3</sup> 96% розчину сульфатної кислоти ( $\rho = 1,84$  г/см<sup>3</sup>) додали 400 см<sup>3</sup> води. Одержані розчин з  $\rho = 1,225$  г/см<sup>3</sup>. Чому дорівнює масова частка та  $C_{Mекв}$  цього розчину?

**21 г. а)** Скласти молекулярні, йонно-молекулярні та скорочені іонні рівняння між речовинами:  $SnCl_2 + (NH_4)_2S$ ;  $SnCl_2 + H_3PO_4$ ;

**б)** Скласти молекулярні, йонно-молекулярні та скорочені йонні рівняння гідролізу солей вказати реакцію розчинів:  $FeCl_3, ZnSO_4, Na_2CO_3$ .

**22 а.** Складіть рівняння хімічної реакції та визначте тепловий ефект за стандартних умов, який це процес за напрямком обміну теплотою? Визначити зміну ентропії реакції за стандартних умов, враховуючи, що отримано 0,485 кг  $Cl_2$ . Визначити можливість самодовільного перебігу реакції.  $CCl_4(g) + O_2(g) = CO_2(g) + Cl_2(g)$

**22 б.** Визначить швидкість прямої та зворотної реакцій та записати вирази для константи рівноваги цих процесів. Як зміниться рівновага якщо  $C\downarrow, T\downarrow, P\downarrow$ . Які умови потрібні для збільшення виходу продуктів реакцій:




**22 в.** Скільки води треба додати до 100 см<sup>3</sup> 48%-ого розчину нітратної кислоти ( $\rho = 1,303$  г/см<sup>3</sup>), щоб отримати 20% розчин?


**22 г. а)** Скласти молекулярні, йонно-молекулярні та скорочені іонні рівняння між речовинами:  $MgSO_4 + Ba(OH)_2$ ;  $CaCl_2 + MgSO_4$

б) Скласти молекулярні, йонно-молекулярні та скорочені йонні рівняння гідролізу солей вказати реакцію розчинів:  $CuSO_4$ ,  $K_2CO_3$ ,  $CaS$ .

**23 а.** Складіть рівняння хімічної реакції та визначить тепловий ефект за стандартних умов, враховуючи, що отримано 0,485кг  $ZnS$ . Який це процес за напрямком обміну теплотою? При  $t = 30^{\circ}C$  може відбутися: а) пряма реакція; б) обернена реакція; в) система буде знаходитися у стані рівноваги?



**23 б.** Визначить швидкість прямої та зворотної реакцій та записати вирази для константи рівноваги цих процесів. Як зміниться рівновага якщо  $C \uparrow$ ,  $T \uparrow$ ,  $P \downarrow$ . Які умови потрібні для зменшення виходу продуктів реакцій:




**23 в.** Яка масова частка розчину нітратної кислоти якщо до  $500 \text{ см}^3$  її 32%-ого розчину ( $\rho = 1,2 \text{ г/см}^3$ ), додали  $1 \text{ дм}^3$  води?

**23 г. а.** Скласти молекулярні, йонно-молекулярні та скорочені іонні рівняння між речовинами:  $CuSO_4 + NaOH$ ;  $CuSO_4 + H_3PO_4$ ;

**б)** Скласти молекулярні, йонно-молекулярні та скорочені йонні рівняння гідролізу солей вказати реакцію розчинів: б)  $K_2S$ ,  $KCN$ ,  $AlCl_3$ .

**24 а.** Складіть рівняння хімічної реакції та визначте тепловий ефект за стандартних умов, враховуючи, що отримано 1,36 кг  $CaC_2$ ; Який це процес за напрямком обміну теплотою? При якій температурі відбудеться обернена реакція; система буде знаходитися у стані рівноваги?



**24 б.** Визначить швидкість прямої та зворотної реакцій та записати вирази для константи рівноваги цих процесів. Як зміниться рівновага якщо  $C \downarrow$ ,  $T \downarrow$ ,  $P \uparrow$ . Які умови потрібні для зменшення виходу продуктів реакцій:




**24 в.** Одержані суміш  $100 \text{ см}^3$  50%-ого розчину ( $\rho = 1,4 \text{ г/см}^3$ ) та  $100 \text{ см}^3$  10%-ого розчину ( $\rho = 1,07 \text{ г/см}^3$ ) сульфатної кислоти. До суміші додали  $3 \text{ дм}^3$  води. Визначити  $C_{\text{Мекв}}$  цього розчину.

**24 г. а)** Скласти молекулярні, йонно-молекулярні та скорочені іонні рівняння між речовинами:  $Pb(NO_3)_2 + NaI$ ;  $Pb(NO_3)_2 + NaOH$ ;


**б)** Скласти молекулярні, йонно-молекулярні та скорочені йонні рівняння гідролізу солей вказати реакцію розчинів: б)  $Na_2SiO_3$ ,  $CrCl_3$ ,  $Na_2S$ .

**25 а.** Складіть рівняння хімічної реакції та визначте тепловий ефект за стандартних умов, який це процес за напрямком обміну теплотою? Визначити зміну ентропії реакції за стандартних умов, враховуючи, що

отримано  $4,48 \text{ м}^3 Cl_2$ . Визначити можливість самодовільного перебігу реакції.



**25 б.** . Визначить швидкість прямої та зворотної реакцій та записати вирази для константи рівноваги цих процесів. Як зміниться рівновага якщо  $C\downarrow, T\downarrow, P\uparrow$ . Яки умови потрібні для зменшення виходу продуктів реакцій:



**25 в.** До  $100 \text{ см}^3 80\%$  розчину нітратної кислоти ( $\rho = 1,46 \text{ г/см}^3$ ) додали  $400 \text{ см}^3$  води, розчин має  $\rho = 1,128 \text{ г/см}^3$ . Визначити масову частку та  $C_{\text{Мекв}}$  цього розчину.


**25 г. а)** Скласти молекулярні, йонно-молекулярні та скорочені іонні рівняння між речовинами:  $Ba(NO_3)_2 + Na_2S$ ;  $Ba(NO_3)_2 + H_2SO_4$ ;

**б)** Скласти молекулярні, йонно-молекулярні та скорочені йонні рівняння гідролізу солей вказати реакцію розчинів:**б)**  $CdSO_4$ ,  $Al(NO_3)_3$ ,  $MnCl_2$ .

**26 а.** Складіть рівняння хімічної реакції та визначить тепловий ефект за стандартних умов, враховуючи, що отримано  $1,008 \text{ м}^3 C_2H_2$ , Який це процес за напрямком обміну теплотою? При  $t = 20^\circ\text{C}$  може відбутися: а) пряма реакція; б) обернена реакція; в) система буде знаходитися у стані рівноваги?




**26 б.** . Визначить швидкість прямої та зворотної реакцій та записати вирази для константи рівноваги цих процесів. Як зміниться рівновага якщо  $C\downarrow, T\downarrow, P\downarrow$ . Яки умови потрібні для збільшення виходу продуктів реакцій:




**26 в.** Яка масова частка розчину сульфатної кислоти яку одержали додаванням до  $400 \text{ см}^3$  її  $70\%$ -ого розчину ( $\rho = 1,61 \text{ г/см}^3$ )  $500 \text{ см}^3$  води.

**26 г. а)** Скласти молекулярні рівняння за йонними рівняннями:




**б)** Яка з двох солей при одинакових умовах у більшому ступені підлягає гідролізу, чому? Відповідь підтвердити молекулярними, йонно-молекулярними та скороченими рівняннями:  $FeCl_2$  чи  $FeCl_3$ ;  $MgCl_2$  чи  $ZnCl_2$ .

**27 а.** Складіть рівняння хімічної реакції та визначте тепловий ефект за стандартних умов, враховуючи, що отримано  $1,344 \text{ м}^3 CO_2$ ; Який це процес за напрямком обміну теплотою? При якій температурі відбудеться обернена реакція; система буде знаходитися у стані рівноваги?



**27 б.** Визначить швидкість прямої та зворотної реакцій та записати вирази для константи рівноваги цих процесів. Як зміниться рівновага якщо  $C\uparrow, T\uparrow, P\downarrow$ . Яки умови потрібні для зменшення виходу продуктів реакцій:




**27 в.** Для розчинення наважки  $CaCO_3$  потрібно 35 см<sup>3</sup> 1,025 н розчину  $HCl$ . Визначити масу карбонату кальцію, яка потрібна для цього.

**27 г а)** Скласти молекулярні рівняння за йонними рівняннями:




б) Яка з двох солей при одинакових умовах у більшому ступені підлягає гідролізу, чому? Відповідь підтвердити молекулярними, йонно-молекулярними та скороченими рівняннями: б)  $NaCN$  чи  $CH_3COONa$ ;  $Na_2CO_3$  чи  $Na_2SO_3$ .

**28 а.** Складіть рівняння хімічної реакції та визначте тепловий ефект за стандартних умов, який це процес за напрямком обміну теплотою? Визначити зміну ентропії реакції за стандартних умов, враховуючи, що отримано 1,32 кг  $(NH_4)_2SO_4$ . Визначити можливість самодовільного перебігу реакції.




**28 б.** Визначить швидкість прямої та зворотної реакцій та записати вирази для константи рівноваги цих процесів. Як зміниться рівновага якщо  $C\downarrow, T\downarrow, P\uparrow$ . Які умови потрібні для зменшення виходу продуктів реакцій:




**28 в.** Визначити  $C_{Мекв}$  та титр 18%-ого розчину гідроксиду натрію ( $\rho = 1,203 \text{ г/см}^3$ ).

**28 г а)** Скласти молекулярні рівняння за йонними рівняннями:




б) Яка з двох солей при одинакових умовах у більшому ступені підлягає гідролізу, чому? Відповідь підтвердити молекулярними, йонно-молекулярними та скороченими рівняннями: б)  $TlCl$  чи  $TlCl_3$ ,  $SnCl_2$  чи  $SnCl_4$ .

**29 а.** Складіть рівняння хімічної реакції та визначить тепловий ефект за стандартних умов, враховуючи, що отримано 0,34 кг  $NH_3$ ,  $t = 25^\circ C$ . Який це процес за напрямком обміну теплотою? При  $t = 25^\circ C$  може відбутися: а) пряма реакція; б) обернена реакція; в) система буде знаходитися у стані рівноваги?




**29 б.** Визначить швидкість прямої та зворотної реакцій та записати вирази для константи рівноваги цих процесів. Як зміниться рівновага якщо  $C\uparrow, T\uparrow, P\uparrow$ . Які умови потрібні для збільшення виходу продуктів реакцій:




**29 в.** До 1 дм<sup>3</sup> 10% KOH ( $\rho = 1,092 \text{ г/см}^3$ ) додали 0,5 дм<sup>3</sup> 5%-ого розчину ( $\rho = 1,045 \text{ г/см}^3$ ). До суміші додали воду до загального об'єму 3 дм<sup>3</sup>. Визначити  $C_M$  цього розчину.

**29 г а)** Скласти молекулярні рівняння за йонними рівняннями:




б) Яка з двох солей при одинакових умовах у більшому ступені підлягає гідролізу, чому? Відповідь підтвердити молекулярними, йонно-молекулярними та скороченими рівняннями: б)  $CH_3COONa$  чи  $HCOONa$ ;  $K_2S$  чи  $K_2Te$ .

**30а.** Складіть рівняння хімічної реакції та визначте тепловий ефект за стандартних умов, враховуючи, що отримано 1,12 м<sup>3</sup>  $SO_2$ . Який це процес за напрямком обміну теплотою? При якій температурі відбудеться обернена реакція; система буде знаходитися у стані рівноваги?




**30б.** Визначить швидкість прямої та зворотної реакцій та записати вирази для константи рівноваги цих процесів. Як зміниться рівновага якщо C↓, T↓, P↓. Які умови потрібні для збільшення виходу продуктів реакцій:



**30 в.** Який об'єм 96%-ої сульфатної кислоти ( $\rho = 1,84 \text{ г/см}^3$ ) потрібен для приготування 3 дм<sup>3</sup> 0,4 н розчину?

**30 г а)** Скласти молекулярні рівняння за йонними рівняннями:



б) Яка з двох солей при одинакових умовах у більшому ступені підлягає гідролізу, чому? Відповідь підтвердити молекулярними, йонно-молекулярними та скороченими рівняннями: б)  $NaNO_2$  чи  $NaCl$ ,  $NaCN$  чи  $CH_3COONa$ .

## Модуль 4 (теоретичний) ; модуль 5 (практичний)

### Теоретична частина та приклади розв'язання завдань

#### Розділ 5. ОСНОВИ ЕЛЕКТРОХІМІЇ

Теоретичні знання і практичні навички студенти можуть отримати після опрацювання наступної рекомендованої літератури: [1] С.271-308; [5] С.178-220; [12] С.255-291.

**Електрохімічні процеси** – це процеси, що відбуваються за участю електронів та іонів в розчинах або розплавах електролітів (електроліти – речовини, які здатні проводити електричний струм за рахунок заряджених аніонів та катіонів). Електрохімічні процеси найчастіше розглядаються в окисно-відновних реакціях, електролізі, корозії, роботі гальванічних

елементів та акумуляторів. Окисно-відновні реакції – найбільш поширені і відіграють значну роль у природі й техніці, а також лежать в основі природоохоронних заходів. Вони є основою життєдіяльності, з ними пов'язані дихання та обмін речовин у живих організмах, гниття та бродіння, фотосинтез у зелених частинах рослин, їх можна спостерігати при згоранні палива, в процесах корозії металів, під час електролізу. Також вони лежать в основі металургійних процесів і кругообігу елементів у природі. Внаслідок окисно-відновних реакцій хімічна енергія перетворюється на електричну в гальванічних елементах і акумуляторах.

## 5.1 Окисно-відновні реакції

Хімічні реакції класифікують за різними ознаками. За зміною числа вихідних і кінцевих речовин; за виділенням або поглинанням енергії реакції; залежно від фазового стану середовища реакції поділяють на гомогенні та гетерогенні; за наявністю каталізатора; за типом енергетичної дії на речовину (термохімічні, фотохімічні) та ін.

Всі хімічні реакції можна ще розділити на два типи. До першого належать реакції, які відбуваються без зміни ступеня окиснення атомів, що входять до складу реагуючих речовин. До другого типу належать реакції, що відбуваються зі зміною ступеня окиснення атомів реагуючих речовин – вони називаються окисно-відновними. А зміна ступеня окиснення пов'язана зі зміщенням або переходом електронів.

*Ступінь окиснення* – це умовний заряд атома в сполучі, обчислений за припущення, що вона складається тільки з іонів. Окисники і відновники можуть бути як простими речовинами, тобто такими, що складаються з одного елемента, так і складними. Атоми більшості металів містять на зовнішньому енергетичному рівні тільки 1-2 електрони, тому в хімічних реакціях вони віддають ці валентні електрони, тобто окиснюються. Метали виявляють відновні властивості.

У періодах з підвищением порядкового номера елемента відновні властивості простих речовин знижується, а окисні – зростають і стають максимальними у галогенів. Наприклад, у III періоді натрій – найактивніший у періоді відновник, а хлор – найактивніший у періоді окисник. У елементів головних підгруп з підвищением порядкового номера посилюються відновні властивості і послаблюються окисні.

Найкращі відновники – лужні метали, а найактивніші із них це Fr і Cs. Найкращі окисники – галогени, елементи головних підгруп IV-VII груп (неметали) можуть як віддавати, так і приєднувати електрони і виявляти відновні та окисні властивості.

Винятком є Флуор. Він виявляє тільки окисні властивості, оскільки має найбільшу відносну електронегативність. Елементи побічних підгруп

мають металевий характер, оскільки на зовнішньому енергетичному рівні їх атомів містяться 1-2 електрони. Тому їх прості речовини є відновниками. Отже, на відміну від простих речовин – металів, що виступають у ролі відновників, прості речовини – неметали проявляють себе і як окисники, і як відновники.


Найважливіші відновники	Найважливіші окисники
Метали, водень, вугілля Оксид карбону (II) $CO$ Сірководень $H_2S$ , оксид сульфуру (IV) $SO_2$ , сульфітна кислота $H_2SO_3$ та її солі Йодоводнева кислота $HI$ , бромоводнева $HBr$ , хлороводнева $HCl$ . Хлорид стануму (II) $SnCl_2$ , сульфат феруму (II) $FeSO_4$ , сульфат мангану (II) $MnSO_4$ , сульфат хрому $Cr_2(SO_4)_3$ .	Галогени Перманганат калію $KMnO_4$ , Манганик калію $K_2MnO_4$ , Оксид мангану (IV) $MnO_2$ , Дихромат калію $K_2Cr_2O_7$ , Хромат калію $KCrO_4$ , Нітратна кислота $HNO_3$ , Кисень $O_2$ , озон $O_3$ , Пероксид гідрогену $H_2O_2$ , Іони благородних металів

### *Метод напівреакцій або йонно-електронний метод*


Як видно із самої назви, цей метод ґрунтуються на складанні йонних рівнянь для процесу окиснення і процесу відновлення з подальшим складанням загального рівняння. Для виконання цих рівнянь потрібно керуватися загальними правилами складання йонних реакцій. Цей метод дає екологічну інформацію про те, у яких формах існує відновник та окисник у розчинах, тобто про те, як змінюється біохімічна активність сполук внаслідок цих реакцій.

Сильні електроліти записують у вигляді йонів; слабкі електроліти, неелектроліти, газоподібні речовини, оксиди та осади – у вигляді формульних одиниць. В йонну схему включають частинки, які характеризують середовище, тобто:  $H^+$  – кисле середовище;  $OH^-$  – лужне та  $H_2O$  – нейтральне.


Якщо в лівій частині напівреакції недостача атомів окисигену, його компенсують атомами кисню води, а в правій частині з'являються йони гідрогену за схемою:



а в лужному – додаванням подвійної кількості груп  $OH^-$ , тобто:




У нейтральних розчинах у ліву частину напівреакції додають тільки воду. Якщо в лівій частині є надлишок атомів Оксигену, вони зв'язуються молекулами води за схемою:




У методі напівреакцій можна виходити не із ступенів окиснення (величин досить умовних), а з реальних зарядів тих йонів чи молекул, що існують у розчині.

Нарешті, не обов'язково знати всі речовини, які утворюються, вони з'являються в рівнянні реакції під час його виведення. Тому методу напівреакцій слід віддавати перевагу і застосовувати його під час складання рівнянь всіх окисно-відновних реакцій, що відбуваються у водних розчинах.


Наприклад, запишемо процес дихання або окиснення глюкози – це реакція є основою життєдіяльності. Він послідовний, але остаточні продукти – це оксид вуглецю (IV) та вода:




Визначаючи ступінь окиснення для глюкози отримаємо 0, якщо це викликає непорозуміння, можемо її не використовувати. Напівреакції складаємо з йонів та молекул, у даному випадку є тільки молекули, тому отримаємо такі алгоритми:




Далі  $O_2$  повинен відновлюватися, тому:



Об'єднавши ці процеси отримаємо:




Остаточно рівняння має вигляд:




Класифікація окисно-відновних реакцій. Розрізняють типи окисно-відновних реакцій: міжмолекулярні, внутрішньомолекулярні і реакції диспропорціонування.


До міжмолекулярних належать реакції, у яких окисник і відновник входять до складу різних речовин. Сюди також слід віднести і реакції між різними речовинами, в яких атоми одного і того самого елемента мають різні ступені окислення:




До внутрішньомолекулярних належать такі реакції, в яких окисник і відновник входять до складу однієї і тієї самої речовини. У цьому випадку атом з більшим позитивним ступенем окиснення окиснює атом з меншим ступенем окиснення. Такими реакціями є реакції термічного розкладу:



Сюди слід віднести і розклад речовин, у яких атоми одного й того ж самого елемента мають різні ступені окиснення:



Перебіг реакцій диспропорціонування (раніше називали самоокиснення-самовідновлення) супроводжується одночасним збільшенням і зменшенням ступеня окиснення атомів одного і того самого елемента. Праворуч утворюються сполуки, одна із яких містить атоми з вищим, а друга – з нижчим ступенем окиснення, це можливо для речовин, що містять атоми з проміжними ступенями окиснення. Наприклад:




## 5.2 Електродний потенціал

Окисно-відновні процеси, які існують одночасно у всьому об'ємі електроліту (гомогенні системи) відрізняються від електрохімічних процесів, які відбуваються в основному на межі поділу двох контакуючих фаз: електронного та йонного провідників (гетерогенні системи).


До провідників I роду – електронних провідників, відносяться метали та напівпровідники з електронною провідністю, до провідників II роду, тобто до йонних провідників, відносяться розчини або розплави електролітів або тверді електроліти. Систему, яка містить електронний та йонний провідники, називають *електродом*.

При контакті електронного та йонного провідників на межі поділу фаз виникає подвійний електричний шар (ПЕШ), що можна порівняти з електричним конденсатором, якому в свою чергу відповідає певне значення стрибка потенціалу. Кожен метал має «вільні» електрони. Концентрація їх у різних металах неоднакова. У разі занурення металу у водний розчин електроліту, полярні молекули води взаємодіють з катіонами поверхневого шару металу та полегшують перехід йонів металу у розчин згідно рівняння:




У цьому випадку метал заряджується позитивно, а у приелектродному просторі концентруються негативні йони (аніони). Таким чином, залежно від того, який процес превалює, електрод може заряджатися позитивно або негативно до наступу рівноваги.

Здатність посилати свої йони у розчин для різних металів неоднакова. Так, для активних металів (*Mg*, *Zn*, *Cr*) більш імовірним є процес переходу катіонів з поверхневого шару металу у розчин, а поверхня таких металів у розчині заряджається негативно. Для малоактивних металів (*Cu*, *Ag*, *Hg*) має перевагу зворотній процес, тобто адсорбція катіонів з розчину на поверхні металу, остання заряджається позитивно, а цей механізм утворення ПЕШ – іоногенний.




Кількісною характеристикою ПЕШ є електродний потенціал. Абсолютне значення його виміряти не можна, тому використовують відносні значення електродних потенціалів, які вимірюють щодо стандартного електрода порівняння. Найпоширенішими електродами порівняння є водневий, хлорсрібний, каломельний. Потенціал стандартного водневого електрода умовно вважають нульовим.

Водневий електрод складається з платинової пластинки, вкритою платиновою чернью (методом електролізу осадженою платиною), яка занурена у розчин сульфатної кислоти з активністю йонів гідрогену 1 моль/дм<sup>3</sup> і омивається струменем водню під тиском 101,325 кПа при 298 К (стандартні умови). Молекулярний водень, проходячи крізь розчин підходить до поверхні платини. На її поверхні відбувається розщеплення молекул водню на атоми та їх адсорбція (закріплення на поверхні). Повніше рівновага у водневому електроді виражається схемою:



Дію водневого електрода можна зрозуміти, уявивши собі, нібито електрод зроблено з твердого водню та він поводиться як метал. Тоді на межі поділу фаз виникає рівновага:



Водневий електрод являє собою приклад адсорбційного ПЕШ, стандартний потенціал якого умовно прийнято рівним нулю. Якщо тепер пластинку будь-якого металу, зануреної в розчин його солі з активністю іонів металу 1 моль/дм<sup>3</sup> з'єднати зі стандартним водневим електродом, то утвориться гальванічний елемент – електрохімічний ланцюг, напругу якого легко виміряти. Ця напруга (раніше її називали електрорушайною силою) – називається стандартним електродним потенціалом даного електрода ( $E^\circ$ ).

Дійсно, якщо цинкову пластину занурити у розчин сульфату цинку з активністю іонів 1 моль/дм<sup>3</sup> та з'єднати її з нормальним водневим електродом-проводником, а розчини – сольовим ключем (розчин  $KNO_3$ ), то напруга цього гальванічного елементу буде дорівнювати:

$$E^\circ = E^\circ(2H^+/H_2) - E^\circ(Zn^{2+}/Zn^0) = - E^\circ(Zn^{2+}/Zn^0)$$

Отже *стандартним електродним потенціалом* гальванічного елемента називають напругу електрохімічного ланцюга, яка складається з електрода, що досліджується та стандартного водневого електрода, виміряного за стандартних умов. Розміщуючи метали у порядку зростання алгебраїчного значення їх стандартних електродних потенціалів (що відповідає зменшенню хімічної активності металів) одержують ряд стандартних електродних потенціалів (РСЕП), представлений у додатку. До нього можуть бути включені й інші окисно-відновні системи (в тому числі неметалічні) відповідно до значень  $E^\circ$ .


Рядом стандартних електродних потенціалів слід користуватися із врахуванням особливостей процесів.

Найголовніше треба мати на увазі, що його можна застосувати тільки для водних розчинів і що він характеризує хімічну активність металів лише в окисно-відновних реакціях, які відбуваються у водному середовищі за стандартних умов. З нього випливають такі практичні висновки:


**а)** Метали, що мають потенціал менш ніж - 0,413 В, термодинамічно здатні витісняти водень з води, наприклад значення водневого потенціалу -0,413 В характеризує процес відновлення водню із води при pH = 7 .

Це має відношення до металів, що стоять у РСЕП до магнію, ті що стоять у РСЕП після магнію, за звичайних умов з водою не взаємодіють, тому що покриті оксидними плівками. Дуже часто помиляються, якщо на основі РСЕП пишуть рівняння реакцій витіснення металів з розчинів їх солей більш активними лужними та лужноземельними металами, цього не відбувається, тому що активні метали самі реагують з водою.

**б)** Кожний метал, що стоять у РСЕП після магнію, має властивість витісняти всі наступні метали з розчинів їх солей, наприклад:




Проте це не означає, що витіснення буде обов'язково відбуватися у всіх випадках. Так, алюміній витісняє мідь з розчину хлориду міді (ІІ) за рівнянням:



але практично не витісняє її з розчину  $CuSO_4$ ; це пояснюється тим, що хлорид-йони  $Cl^-$  значно швидше руйнують поверхневу плівку на алюмінії ніж сульфат-йони  $SO_4^{2-}$ .

**в)** Всі метали, що мають від'ємні значення стандартних електродних потенціалів, тобто стоять в ряду до водню, витісняють водень з розведених кислот-неокиснювачів ( $HCl$ ,  $H_2SO_4$ ) і при цьому розчиняються в них, наприклад:



Метали, що стоять в РСЕП після водню, не витісняють його з розчину.

Благородні метали ( $Pt$ ,  $Pd$ ,  $Au$ ), а також графіт через високу енергію іонізації не утворюють ПЕШ внаслідок обміну з розчином заряджених частинок, це інертні електроди. На таких електродах (розчин, де вони занурені не утримує катіонів цих металів) ПЕШ виникає внаслідок вибіркової адсорбції молекул, атомів або йонів.

За умов, що відрізняються від стандартних, числове значення електродного потенціалу визначають за формулою Нернста:

$$E = \frac{E_{Me^{x+} / Me^0}^0 + \frac{RT}{xF} \ln [Ox]}{Red}$$

або

$$E = E_{Me^{x+} / Me^0}^0 + \frac{0.059}{x} \lg C,$$

де  $E^0$  – стандартне значення електродного потенціалу;

$R = 8,314$  кДж/моль·К (універсальна газова стала);

$T$  – термодинамічна температура ( $T^0 = 298$  К);

$F = 96494$  Кл (стала Фарадея);

$[Ox]$ ,  $[Red]$  – відносна окиснена і відновлена активність речовини;


$x$  – кількість відданих або приєднаних електронів.

### 5.3 Гальванічний елемент


**Гальванічний елемент** – це пристрій однократної дії, в якому хімічна енергія окисно-відновного процесу перетворюється в електричну енергію. Гальванічний елемент можна скласти з двох нерозчинних у воді металів,

занурених у розчин їх солей, прикладом такого приладу є гальванічний елемент Якобі-Данієля.

У посудину з розчином сульфату цинку занурюють цинкову пластинку, а в посудину з розчином сульфату міді – мідну пластину. Ці посудини з'єднують U-подібною трубкою, заповненою електролітом ( $KNO_3$ ,  $KCl$ ). Якщо пластинки  $Zn$  і  $Cu$  з'єднати дротом, від цинку до міді піде електричний струм, тобто починають рухатися електрони, тому що цинк накопичує більше електронів при встановленні рівноваги  $Me/Me^{n+}$ .




Таким чином, у процесі роботи гальванічного елемента атоми металу анода віддають свої електрони та у вигляді катіонів переходят у розчин (анод розчиняється). Електрони по зовнішньому ланцюгу перетікають на катод, де на межі поділу приєднуються до катіонів міді, що містяться у приелектродному просторі, тобто на катоді осаджується металева мідь. Отже, маса анода ( $Zn$ ) при роботі гальванічного елемента зменшується, а маса катода – збільшується. Робота гальванічного елемента може бути відображенна схемою:




Електрод, на якому відбувається окиснення, називають анодом, а електрод, на якому відбувається відновлення – катодом, або металевий електрод з більш позитивним потенціалом є катодом, а з більш негативним – анодом.

**Оксисненням** умовно називається процес віддачі електронів атомом, молекулою або йоном, ці частинки – відновники, під час реакції вони окислюються, їх ступень окиснення підвищується, наприклад:



**Відновленням** називається процес приєднання електронів атомом, молекулою або йоном, це – окисники, під час реакції вони відновлюються, їх ступень окиснення знижується, наприклад:



**Ступінь окиснення** – це умовний заряд, який отримує частинка при віддачі чи приєднанні декілька електронів.

Окиснення завжди супроводжується відновленням, і навпаки, відновлення завжди пов'язане з окисненням, тому це є єдність двох протилежних процесів. Число електронів що їх віddaє відновник, дорівнює числу електронів які приєднує окисник.

Процеси окиснення й відновлення можна фізично відокремити один від одного і здійснити перенесення електронів по зовнішньому електричному колу.

**Напруга гальванічного елемента** буде дорівнювати:

$$E = E^0(\text{катода}) - E^0(\text{анода}),$$

тоді у випадку мідно-цинкового гальванічного елементу, якщо:

$$E^0(Zn^{2+}/Zn^0) = -0,76 \text{ В}; E^0(Cu^{2+}/Cu^0) = +0,34 \text{ В},$$

то:

$$E_{\text{г.е.}} = E^0(Cu^{2+}/Cu^0) - E^0(Zn^{2+}/Zn^0) = +0,34 - (-0,76) = 1,1 \text{ В.}$$

В таких випадках потенціал окисника більший, ніж потенціал відновника, тобто розглянуті окисно-відновні реакції перебігатимуть самовільно, але тільки у вказаному напрямку, а складені гальванічні елементи генеруватимуть електроенергію.

Напруга електрохімічної системи пов'язана зі зміною енергії Гіббса:

$$\Delta G^0 = -n F E^0_{(\text{г.е.})},$$

де  $n$  – кількість електронів, які беруть участь в одиночному процесі.

Негативне значення енергії Гіббса підтверджує напрямок довільного перебігання електродних реакцій.

Для елемента Якобі розрахуємо:

$$\Delta G^0 = -2 \cdot 96494 \cdot 1,1 = -212286,8 \text{ Дж/моль} = -212,3 \text{ кДж/моль}$$

Подібні процеси, де внаслідок самодовільного перебігу електрохімічної реакції при замиканні зовнішнього ланцюга в системі виникає електричний струм, мають місце у роботі макро- та мікрогальванічних елементів, які виникають у процесі корозії металів.

## 5.4 Корозія металів

**Електрохімічна корозія** – це самодовільне руйнування металів в наслідок фізико-хімічної взаємодії їх з оточуючим середовищем і це призводить до зміни їх властивостей. Основною причиною корозії – є термодинамічна нестійкість металів (у вигляді нейтральних атомів у земній корі містяться тільки благородні метали, всі інші – хімічні сполуки), внаслідок чого вони прагнуть перейти в окиснений стан. Тому з

точки зору хімії – **корозія** – це реакція окиснення металу, в результаті якої утворюються катіони металів, що призводить до руйнування:



наприклад:  $Fe - 2\bar{e} = Fe^{2+}$  (в реакції:  $2Fe^0 + O_2^0 = 2FeO$ )

Розрізняють корозію за такими факторами:

- 1) механізм процесу;
- 2) умовами його перебігу;
- 3) характером руйнування.

За механізмом процесу розрізняють хімічну і електрохімічну корозію.

**Хімічна корозія** – це руйнування металу внаслідок взаємодії з середовищем, яке не проводить електричний струм. Під час хімічної корозії електрони від атому металу переходят безпосередньо до окисника. За умовами перебігу розрізняють таки різновиди хімічної корозії: газова корозія – в атмосфері сухих агресивних газів ( $F_2$ ,  $Cl_2$ ,  $NO_2$ ,  $SO_2$ ,  $H_2S$ ) при високих температурах. Корозія в неелектролітах (рідини які не проводять електричний струм: нафта, бензин, толуол). Але найбільшої шкоди завдає електрохімічна корозія.

**Електрохімічна корозія** – це руйнування металу, що знаходиться в контакті з іншим металом і електролітом або водою. На поверхні будь-якого металу на повітрі конденсується вода, в якій розчинено атмосферні гази, тобто утворюється розчин електроліту.

Якщо метал містить домішки або стикається з іншим металом, виникає мікро- або макрогальванічна пара і починається електрохімічна корозія. Чисті метали не зазнають такого процесу, але причиною корозії буде різна аерація поверхні. При електрохімічній корозії поряд з хімічними процесами (відщеплення електронів) відбуваються й електричні (перенесення електронів від однієї ділянки до іншої). Наприклад, при взаємодії металу з молекулами води корозійного середовища – відбуваються два процеси:




окиснення металу  $Me(-) A \quad Me - 2\bar{e} = Me^{2+}$  – анодний процес  
відновлення окисників - компонентів середовища – катодний процес.

Як правило, окисниками будуть  $H^+$  (кисле середовище) або розчинений у воді кисень  $O_2$ , тобто:




Ділянки поверхні металу, на яких відбуваються процеси окиснення і відновлення, називаються відповідно анодними й катодними. Розглянемо, як приклад електрохімічної корозії, реакції під час корозії заліза, де


катодами є частки з більшими значеннями електродного потенціалу (наприклад карбіди заліза). Якщо корозія відбувається в розчині кислоти, тобто в кислому середовищі:



В нейтральному або лужному середовищі маємо:



$Fe(OH)_2$  – гідроксид феруму (ІІ), що утворився, легко окиснюється киснем повітря, тобто відбувається процес:




це відбувається утворення продуктів корозії заліза – *бура іржса* – це суміш гідроксидів феруму (ІІ) і феруму (ІІІ), а також продуктів їх розкладу і взаємодії з  $CO_2$  та іншими речовинами з навколошнього середовища.


Електрохімічна корозія може бути посиlena, якщо метал містить домішки інших речовин, або неметалічні включення. Наприклад, залізо забруднене домішками міді. При цьому виникають гальванічні мікроелементи (пари), схему дії яких наведено нижче.



Метал з більш негативним потенціалом руйнується – його йони переходят у розчин, а електрони переходят до менш активного металу, де і відбувається відновлення йонів гідрогену (воднева деполяризація) або відновлення розчиненого у воді кисню (киснева деполяризація).



Отже, при електрохімічній корозії, як у випадку контакту різнорідних металів (алюмінієвий лист з латунними гвинтами – це приклад макрогальваничного корозійного елемента), так і в разі утворення мікрогальваничних елементів на поверхні одного металу, потік електронів направлений від більш активного металу до менш активного (провідника). На анодних ділянках спостерігається руйнування металу, а на катодних – відновлення корозійно активних речовин, а сам катод(проводник) зберігає свою цілісність. У нашому прикладі: провідник – включення міді, на її поверхні йде відновлення  $H^+$ , а сама вона зберігається і це позначено у запису:




Швидкість корозії тим більша, чим далі розташовані один від одного в ряду стандартних електродних потенціалів ті метали, з яких утворився гальванічний елемент (гальванічна пара). На швидкість впливає і характер розчину електроліту – чим вища його кислотність (тобто менший pH), чим більший вміст в ньому окисників, тим швидше відбувається корозія. Значно зростає корозія при підвищенні температури. Важливе значення мають методи захисту металів та сплавів від корозії.

Це може бути захист поверхні металу за допомогою покриттів металічних (нікелю, цинку, хрому, алюмінію, золота та ін.) або неметалічних (лаків, фарб, смол, гуми, емалей), плівки оксиду – оксидування, плівки солей – фосфатування. Ці покриття ізоляють метал від зовнішнього середовища. Так, покрівельне залізо покривають цинком, шар цинку запобігає корозії заліза.


## 5.5 Електроліз розчинів і розплавів

**Електроліз** – сукупність фізико-хімічних процесів, які відбуваються під впливом постійного електричного струму в електролізерах, який має два електроди та електроліт. У розчинах і розплавах електроліти дисоційовані на йони, які безладно рухаються. Якщо у такий електроліт занурити два електроди та з'єднати їх з джерелом постійного струму, рух йонів стане напрямленим: позитивні йони будуть рухатися до катода, негативні – до анода. Ланцюг замкнеться, крізь розчин піде електричний струм. Катіони біля негативно зарядженого катода відновлюються (приєднують електрони). Аніони біля позитивно зарядженого анода окиснюються (віддають електрони), тобто на аноді протікає процес окиснення. Тобто на електродах і в розчині хімічна реакція відбувається за допомогою електричного струму. Розглянемо електроліз розплаву  $NaCl$  хлориду натрію (плавиться при  $801^\circ C$ ).

В результаті електролізу на катоді виділяється металічний натрій, а на аноді – хлор.




або



Над стрілкою вказують, що процес відбувається при пропусканні електричного струму.

Прилад, у якому проводять електроліз, називають електролізером або електричною ванною.

Під час електролізу водних розчинів солей металів, які в РСЕП знаходяться між алюмінієм і воднем, на катоді одночасно відновлюється метал і водень:




Якщо в розчині знаходяться катіони декількох металів, під час електролізу першими відновлюються катіони металу, який має більші значення електродного потенціалу. Наприклад, розчин містить:  $Cu^{2+}$ ,  $Hg^{2+}$ ,  $Ag^+$  під час електролізу першою буде виділятися ртуть, другим – срібло і останньою – мідь.

Аноди поділяють на інертні або нерозчинні (графіт, золото, платина), та активні або розчинні.


Інертні аноди не беруть участі в електрохімічних процесах і є хімічно стійкими щодо розчину електроліту та продуктів електролізу солей активних металів (у РСЕП до алюмінію), тому електроди, виготовлені з цих самих металів, не будуть хімічно руйнуватися у водних розчинах електролітів.

На інертних анодах, залежно від виду аніона, в розчині або розплаві можуть відбуватися процеси:


- окиснення аніонів безкисневих кислот ( $HC1$ ,  $HBr$ ,  $HI$ ,  $HCN$ ,  $HSCN$ ,  $H_2S$  та інші):




- виділяється  $O_2$ , якщо аніони мають Оксиген ( $SO_4^{2-}$ ;  $NO_3^{3-}$ ;  $PO_4^{3-}$  та ін.):




З такими аніонами кисневих кислот, крім особливих випадків, ніяких перетворень не відбувається. Таким чином, при наявності у розчині або розплаві кількох видів аніонів у першу чергу розряджаються ті аніони, які мають менше значення потенціалу.



Потенціал процесу дорівнює 1,23 В (це стандартний потенціал кисневого електроду). У випадку розчинного аноду відбувається розчинення металу, з якого виготовлено анод, якщо  $E^\circ$  цього металу менший за 1,23 В:



Розчинними анодами, які безпосередньо беруть участь в електролізі, можуть бути мідь, нікель, цинк, срібло та ін. Наприклад, під час електролізу водного розчину сульфату міді (ІІ) з мідним анодом, останній розчиняється, а на катоді виділяється чиста мідь:



Кількісні характеристики електрохімічних процесів описуються законами Фарадея, математичний вираз якого:

$$m = Q \cdot I \cdot t \quad \text{або} \quad m = \frac{M_{\text{екв}}(P) \cdot Q}{F} \quad \text{або} \quad m = \frac{M_{\text{екв}}(P) \cdot I \cdot t}{F}$$

де:  $m$  – маса окисненої або відновленої речовини, г;

$M_{\text{екв}}(P)$  – молярна маса еквівалента речовини, г/моль;

$F$  – стала Фарадея,  $F = 96485$  Кл = 26,8 А/г;

$I$  – сила струму, А;

$t$  – тривалість електролізу, с.

Маса речовини, що виділяється на електродах під час електролізу, пропорційна кількості електрики, яка проходить крізь розчин. Маса речовини, яка виділяється при проходженні 1 Кл електрики, дорівнює молярній масі електрохімічного еквівалента ( $M_{\text{екв}}(P)/F$ ). Однакові кількості електрики виділяють на електродах під час електролізу маси різних речовин, які пропорційні їх молярним масам еквівалентів.



## 5.6 Приклади розв'язання завдань

Приклад 1. Написати схему процесу електролізу розплаву сульфіду калію.

**Розв'язання:** Електроліз – сукупність фізико-хімічних процесів, які відбуваються під впливом постійного електричного струму в електролізерах, який має два електроди та електроліт. У розчинах і розплавах електроліти дисоційовані на йони, які безладно рухаються. Якщо у такий електроліт занурити два електроди та з'єднати їх з джерелом постійного струму, рух йонів стане напрямленим: позитивні йони будуть рухатися до катода, негативні – до анода. Ланцюг замкнеться, крізь розчин піде електричний струм. Катіони біля катода приєднують електрони (катіони відновлюються). Аніони біля анода віддають електрони тобто

окиснюються, отже на аноді протікає процес окиснення. Тобто на електродах і в розчині хімічна реакція відбувається за допомогою електричного струму. Розглянемо схему електролізу розплаву  $K_2S$  сульфіду калію.



В результаті електролізу на катоді виділяється калій, а на аноді – сірка.



Над стрілкою вказують, що процес електролізу відбувається при пропусканні електричного струму.

Приклад 2. Написати схему електролізу розчину сульфату міді, розрахувати за законом Фарадея утворенні продукти процесу (вихід 100%), якщо сила струму 2А, час проходження процесу – 2 години.

Розв'язання: Запишемо схему електролізного процесу, яку можна виразити такими рівняннями реакцій, що відбуваються на електродах:



Продуктами процесу електролізу будуть такі речовини:  $O_2$ ;  $Cu$ ;  $H_2SO_4$ . Кількісні характеристики електрохімічних процесів описуються законами Фарадея, математичний вираз якого:

$$m = Q \cdot I \cdot t \quad \text{або} \quad m = \frac{M_{екв}(P) \cdot Q}{F} \quad \text{або} \quad m = \frac{M_{екв}(P) \cdot I \cdot t}{F}$$

де:  $m$  – маса окисненої або відновленої речовини, г;

$M_{екв}(P)$  – молярна маса еквівалента речовини, г/моль;

$F$  – стала Фарадея,  $F = 96485$  Кл = 26,8 А/г;

$I$  – сила струму, А;

$t$  – тривалість електролізу, с.


Маса речовини, що виділяється на електродах під час електролізу, пропорційна кількості електрики, яка проходить крізь розчин. Маса речовини, яка виділяється при проходженні 1 Кл електрики, дорівнює молярній масі електрохімічного еквівалента ( $M_{екв}(P)/F$ ). Однакові кількості електрики виділяють на електродах під час електролізу маси різних речовин, які пропорційні їх молярним масам еквівалентів.

$$m(\text{Cu}) = \frac{63,5 \cdot \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 7200}{96500} = 4,74 \text{ г},$$


$$V(\text{O}_2) = \frac{22,4 \cdot \frac{1}{4} \cdot 2 \cdot 7200}{96500} = 0,84 \text{ л},$$

$$m(\text{H}_2\text{SO}_4) = \frac{98 \cdot \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 7200}{96500} = 7,3 \text{ г}.$$

Приклад 3. Виходячи з ступеня окиснення елементів у сполуках визначте які з них можуть бути тільки відновниками, тільки окисниками і які виявляють окисні і відновні властивості одночасно:



*Розв'язання.* Ступінь окиснення – це умовний заряд атома в сполуці, обчислений за припущення, що вона складається тільки з йонів. Окисники і відновники можуть бути як простими речовинами, тобто такими, що складаються з одного елемента, так і складними. У деяких хімічних елементів ступені окиснення сталі, наприклад у Оксигену і Гідрогену: ст.ок.(O) = -2; ст.ок.(H) = +1. У нітрогену він змінюється: так ст.ок.(N) = +5 у сполуках  $\text{N}_2\text{O}_5$  та  $\text{HNO}_3$  (вищий ст.ок.); нижчий ст.ок.(N) = -3 у  $\text{NH}_3$ ; в інших випадках – проміжний ступінь окиснення:




Тому Нітроген у вищому ступені окиснення (+5) в  $\text{N}_2\text{O}_5$ ;  $\text{HNO}_3$  є тільки окисником. У випадку  $\text{NH}_3$  Нітроген може бути в реакції тільки відновником, а в інших – окисником і відновником, в залежності від умов протікання реакції.


Приклад 4. Складіть електронні рівняння, визначте окисник і відновник, назвіть які реакції відносяться до окиснення, а які до відновлення. Розставте коефіцієнти в рівнянні реакції методом йонно-електронного балансу:

$$\text{KMnO}_4 + \text{HCl} \rightarrow \text{MnCl}_2 + \text{Cl}_2 + \text{KCl} + \text{H}_2\text{O}$$


*Розв'язання.* Запишемо рівняння в іонному вигляді та підкреслимо ті частинки, що безпосередньо беруть участь в окисно-відновних процесах:



Складаємо рівняння напівреакцій окиснення і відновлення:



За допомогою йонів  $H^+$  та  $H_2O$  встановимо баланс атомів, а за допомогою електронів ( $\bar{e}$ ) – баланс електронів. Знайдемо коефіцієнти та розставимо в рівняння окисно-відновної реакції послідовно в йонній і молекулярній формах:



Перевіримо кількість кожного елемента до і після реакції:



Приклад 5. Визначте який метал буде кородувати при контакті заліза і олова під час: а) атмосферної корозії, б) в кислому середовищі; в) в розчині  $Cu(NO_3)_2$ . Запишіть рівняння реакцій та зробіть висновки.

*Розв'язання:* Метал з більш негативним потенціалом руйнується – його йони переходять у розчин, а електрони переходять до менш активного металу, де і відбувається відновлення йонів гідрогену (воднева деполяризація) або відновлення розчиненого у воді кисню (киснева деполяризація).

Швидкість корозії тим більша, чим далі розташовані один від одного в ряду стандартних електродних потенціалів ті метали, з яких утворився гальванічний елемент (гальванічна пара).

На швидкість корозійного процесу впливає і характер розчину електроліту – чим вища його кислотність (тобто менший pH), чим більший вміст в ньому окисників, тим швидше відбувається корозія.

Порівняємо стандартні електродні потенціали металів:  $E^0(Fe/Fe^{2+}) = -0,44V$ ;  $E^0(Sn/Sn^{2+}) = -0,136$  В. Робимо висновок, що більш активний метал – залізо, він буде кородувати на аноді при корозії, а олово буде катодом, на його поверхні в нейтральному середовищі буде відбуватись киснева деполяризація; в кислому – воднева деполяризація; в розчині нітрату міді – відновлення міді з розчину  $Cu(NO_3)_2$ :

(Анод)  $Fe - 2\bar{e} \rightarrow Fe^{2+}$  (корозія заліза – окиснення металу);

а) (Катод)  $Sn / 2H_2O + O_2 + 4\bar{e} \rightarrow 4OH^-$  (киснева деполяризація) ;

б) (Катод)  $Sn / 2H^+ + 2\bar{e} \rightarrow H_2$  (воднева деполяризація);

в) (Катод)  $Sn / Cu^{2+} + 2\bar{e} \rightarrow Cu$  (відновлення міді).

*Додатково дивись рекомендовану літературу: [12] С.291-296*

## Розділ 6 ДИСПЕРСНО-КОЛОЇДНІ СИСТЕМИ

Теоретичні знання і практичні навички студенти можуть отримати після опрацювання наступної рекомендованої літератури: [1] С.314-350; [8] С.211-230; [9] С.5-31.

## 6.1 Загальні положення

**Дисперсно-колоїдні системи (ДКС)** – це мікрогетерогенні системи, які складають з дисперсійного середовища (розвинника) та дисперсної фаза (розвиненої речовини), які мають розміри частинок  $10^{-7} - 10^{-9}$  м. Обов'язковою властивістю колоїдних систем є їх взаємна нерозчинність, тому такі системи є гетерогенними і мають межу розділу фаз.

Якщо розміри частинок більші ніж  $10^{-7}$  м, то така система називається грубо дисперсною. У випадку коли розміри часточок розвиненої речовини менші ніж  $10^{-9}$  м то спостерігається утворення молекулярних розчинів, які представлені іонами, молекулами, атомами.

Властивості дисперсних систем в основному визначаються їх дисперсністю (або мірою подрібненості дисперсної фази) і значною мірою залежать від агрегатних станів їхніх фаз. Дисперсність системи прийнято виражати через середній діаметр часточок чи питому площу поверхні її дисперсної фази. Для дисперсних систем із сферичними частками дисперсної фази їх можна розрахувати за формулами:

$$S_{\text{пит}} = \frac{6}{D_{\text{ср}}} [\text{м}^2/\text{м}^3] = \frac{6}{D_{\text{ср}} \cdot \rho} [\text{м}^2/\text{кг}]$$

За ступенем дисперсності  $D$  розрізняють три основні класи дисперсних систем;  $D = \frac{1}{d}$ , де  $d$  – розміри колоїдної часточки, якщо:

$D = 10^3 - 10^6$ , тоді  $d = 10^{-3} - 10^{-6}$  м – це грубо дисперсні системи;

$D = 10^7 - 10^9$ , тоді  $d = 10^{-7} - 10^{-9}$  м – це колоїдно-дисперсні системи;

$D = 10^9 - 10^{11}$ , тоді  $d = 10^{-9} - 10^{-11}$  м – це молекулярно-дисперсні системи.


За агрегатним станом дисперсно-колоїдні системи поділяються на всім основних класів:

1. золі – тверда речовина диспергована в рідині (Т/Р);
2. емульсії – рідка речовина - в рідині (Р/Р);
3. піни – газоподібна речовина - в рідині (Г/Р);
4. гелі – рідка речовина - в твердому середовищі (Р/Т);
5. сплави – тверда речовина - в твердому середовищі (Т/Т);
6. тверді піни – газ - в твердому середовищі (Г/Т);
7. аерозоль - рідка речовина – в газоподібному середовищі (Р/Г);
8. пил, дим – тверда речовина – в газоподібному середовищі (Т/Г).

Дисперсно-колоїдні системи мають великий запас поверхневої енергії, тобто високий термодинамічний потенціал. Саме тому, згідно другого закону термодинаміки, такі системи здатні до скорочення площи питомої поверхні розділу фаз. Тому колоїдні системи мають здатність до коагуляції або самодовільного злипання (злиття) частинок, що призводить до укрупнення колоїдних часточок, а потім відбувається поступовий поділ фаз або розшарування системи та седиментація (випадіння осаду).

Дисперсні системи можуть утворюватися як не самовільним способом (шляхом подрібнення дисперсної фази або розчиненої речовини), так і самовільним способом (конденсаційним шляхом або додаванням розчинів електролітів). В обох випадках для стійкості дисперсної системи необхідно додавати стабілізатори – це речовини, які утворюють на поверхні частинок дисперсійної фази шар з поверхнево-активних речовин (ПАР). При адсорбції ПАР частина поверхневої енергії дисперсно-колоїдної системи витрачається на роботу процесу адсорбції (адсорбція – це процес поглинання однієї речовини іншою, що відбувається на межі поділу фаз). В результаті таких складних процесів термодинамічний потенціал системи знижується і система не має можливості для коагуляції часточок, тобто відбувається стабілізація системи. Стабілізація дисперсних систем поверхнево-активними речовинами називається колоїдним захистом.


Стабілізуючу дію електролітів можна розглянути на прикладі утворення гідрозолю йодиду срібла за реакцією:





Якщо в розчині нітрату срібла  $AgNO_3$  поступово при інтенсивному перемішуванні додавати розчин йодиду калію  $KI$ , то осад йодиду срібла формується в присутності таких іонів як:  $K^+$ ;  $I^-$ ;  $Ag^+$ ;  $NO_3^-$ . Так як йодид калію взятий для реакції в недостачі, то йодид-іонів  $I^-$  в розчині майже не існує, тому що вони відразу зв'язуються у нерозчинну сполуку йодиду срібла  $AgI$ , яка утворює нерозчинну сполуку.

В таких умовах на поверхні **ядра** кристалів -  $m(AgI)$  в момент їх утворення будуть адсорбуватися відповідно до правила Панетта-Фаянса іони, які існують в розчині у надлишку і спорідненні з іонами ядра, це в нашому випадку будуть катіони  $Ag^+$  (це потенціал-визначальні іони, що визначають заряд колоїдної часточки).

В ході реакції під дією сил електростатичної взаємодії з розчину до такого утвореного **агрегату** притягуються іони з протилежним зарядом або протийони, в нашему випадку це - нітрат-аніони  $NO_3^-$  (іони, знак електричних зарядів яких протилежний знаку заряду агрегату), але їх кількість є дещо меншою ніж потенціал-визначальних іонів. Тому формулу **гранули** або колоїдної часточки можна записати в такому вигляді:





Середній електричний заряд  $x$  гранул дорівнює алгебраїчній сумі електричних зарядів потенціал-визначальних йонів і противойонів, що входять до складу колоїдних часточок:  $x = n - (n-x)$ .


У формулі міцели  $m$  – число молекул йодиду срібла  $AgI$ , що входять до складу ядра,  $n$  – число потенціал-визначальних або зарядоутворюючих йонів срібла  $Ag^+$ . Як правило  $m$  значно більше  $n$ . Загальне число противойонів  $n$ , але частина з них ( $n-x$ ) входить в адсорбційний шар Гельмгольца і знаходиться поблизу ядра, а інша частина противойонів складає дифузійний шар противойонів міцели.

Поряд із силами електростатичної взаємодії, у дисперсно-колоїдних системах діють також сили дифузії броунівського руху, які обумовлені тепловим рухом молекул середовища. Внаслідок дифузійних процесів частина противойонів  $NO_3^-$  залишається в розчині і має здатність вільно рухатися, яка утворює на поверхні гранули дифузійний шар противойонів. Разом з противойонами дифузійного шару  $NO_3^-$  колоїдні часточки утворюють структурну одиницю дисперсно-колоїдної системи - міцелу.

**Міцела** – це електронейтральна структурна одиниця ДКС, яка складається з ядра та шару Гельмгольца (який утворюють зарядоутворюючі йони та противойони адсорбційного шару), а також з противойонів дифузійного шару.

Стійкий золь йодиду срібла може бути отриманий при дотриманні таких умов: розчини реагентів повинні бути розбавленими і одна з реагуючих речовин береться у надлишку.

Якщо для даної реакції в надлишку буде взятий йодид калію  $KI$ , то реакція, структура і формула колоїдної системи буде мати такий вигляд:




$(mAgi)$  – ядро міцели гідрозоля йодиду срібла;

$[(mAgi) \cdot n\Gamma]^{n-}$  - агрегат


$[(mAgi) \cdot n\Gamma \cdot (n-x)K^+]^{x-}$  - гранула

$\{[(mAgi) \cdot n\Gamma \cdot (n-x)K^+]^{x-} \cdot xK^+\}^o$  - міцела

На першому місці в рівнянні реакції записується речовина **A** (взята в надлишку), на другому місці – речовина **B** (взята в недостачі). Стабілізатором такого розчину буде речовина **A**, що взята в надлишку. Змінюється знак зарядоутворюючих йонів (за правилом Панетта-Фаянса), в нашому випадку на поверхні ядра ( $mAgi$ ) будуть спочатку адсорбуватися потенціал визначальні йони  $n\Gamma$ , а потім противойони  $(n-x)K^+$ , що обумовлює заряд гранули як:  $-x$ .



або



Як вже вище було визначено міцела немає заряду, а значення середнього електричного заряду колоїдних часточок визначається різницею електростатичних потенціалів, що виникає між колоїдними частинками й розчином при встановленні рівноваги в системі. Ця різниця потенціалів називається електрокінетичним дзета-потенціалом ( $\zeta$ -потенціал) системи. Чим більше значення  $\zeta$ -потенціалу системи, тим більше значення середнього електричного заряду колоїдних часточок.

Наявність у колоїдних часточок однайменних електричних зарядів призводить до їхнього взаємного відштовхування, це перешкоджає можливості злипання (злиття) часточок дисперсної фази, тим самим, надає системі так звану колоїдну стійкість.

Чим більше значення середнього електричного заряду колоїдних часточок, тим більші сили їхнього взаємного відштовхування. Отже, чим більше –  $\zeta$ -потенціал міцел системи ДКС, тим більше її колоїдна стійкість.

Електроліт, до складу якого входять йони, які адсорбуються на поверхні дисперсних часточок (потенціал визначальні іони), називається електролітом-стабілізатором.

## 6.2 Властивості колоїдних систем

**Оптичні властивості ДКС.** Для мікрогетерогенних систем найбільш характерним оптичним явищем є розсіювання світла, вперше описане М.Фарадеєм у 1857 році.

При бічному освітленні в колоїдних системах відбувається явище *опалесценції* (це розсіювання й переливання світла, що проходить крізь розчин ДКС, та набування ним блакитно-жовтого забарвлення), хоча в прохідному свіtlі колоїдні розчини можуть виглядати прозорими. Також явище розсіювання світла розчинами ДКС докладно досліджував Дж.Тіндалль (1868-1894), який спостерігав проходження світла крізь колоїдну систему у вигляді конусу на темному фоні (ефект Тіндаля).

Джерелом вторинних світлових хвиль, що обумовлюють виникнення розсіяного світла, згідно теорії Дж. Релея (1889-1894), є індуковані диполі, що пропускають у всіх напрямках світло такої ж довжини хвилі, що й падаюче світло. Періодична зміна розподілу зарядів перетворює молекули і частинки в диполь-електричне джерело електричних хвиль, таке випромінювання диполів називають розсіянням.

Відповідно до рівняння Дж. Релея, яке є математичним виразом закону розсіювання світла, воно характерне для розведених дисперсних систем та частинок з розмірами набагато меншими ніж довжина хвилі падаючого світла, інтенсивність світlorозсіювання дуже залежить від довжини світла. Коли розміри частинок збільшуються, то свіtlorозсіювання переходить у відбиття світла і інтенсивність розсіяного світла зменшується.

Підвищення концентрації речовини, що поглинає світло (дисперсної фази), приводить до відповідного світлопоглинання, яке пропорційне концентрації колоїдного розчину. Відповідно до рівняння закону Ламберта-Бера:

$$I_n = I_o \cdot e^{-k \cdot c \cdot l}$$

інтенсивність світла, що пройшло крізь колоїдну систему прямо пропорційно концентрації дисперсної фази в цьому розчині, тобто при малих концентраціях інтенсивність світла зменшується для розведених відносно тонких шарів колоїдних розчинів.

**Електрокінетичні властивості ДКС.** Гранули або колоїдні частинки мають електричні заряди, завдяки яким вони не здатні до об'єднання, злипання або осадження. Виникнення заряду на часточці пояснюється адсорбцією поверхнею частинки потенціал-визначальних

йонів з розчину. Знак заряду і його величина залежать від способу одержання колоїдного розчину, концентрації йонів, температури, природи розчинника та інших факторів.

Заряд колоїдних частинок можна визначити експериментальним шляхом: під дією постійного електричного струму катіони, які заряджені позитивно, рухаються до негативно зарядженого катоду, а аніони (із негативними зарядами - до позитивно зарядженого аноду). Процес переміщення частинок колоїдного розчину в електричному полі називається *електрофорезом*.

В ізоелектричному стані міцела немає заряду, тому що в ній відсутній дифузійний шар противойонів і заряд гранули є нейтральним і повністю скомпенсованим (кількість противойонів і зарядоутворюючих йонів стає рівною). Тобто при певних концентраціях електролітів колодна частинка втрачає електричний заряд і вже не може рухатися в постійному електричному полі під час електрофорезу.

**Молекулярно-кінетичні властивості ДКС:** броунівський рух, дифузія, седиментація, коагуляція пов'язані із певними розмірами колоїдних частинок ( $10^{-7}$ - $10^{-9}$ м).

Якщо в колоїдних розчинах сили притяжіння між частинками, які стикаються одна з одною (наприклад, внаслідок броунівського руху), більші за сили взаємного відштовхування, то відбувається об'єднання частинок в більш великі агрегати, що призводить до втрати агрегативної стійкості. Процес злипання колоїдних частинок, який призводить до їх укрупнення та втрати молекулярно-кінетичної рухливості називають *коагуляцією*. Вона в подальшому призводить до втрати колоїдною системою седиментаційної стійкості, тому часто супроводжується випадінням осаду або *седиментацією*.

Якщо в дисперсно-колоїдну систему вводити велику кількість електроліту, то відбувається збільшення кількості противойонів в адсорбційному шарі ДКС. Це спричинює за собою зменшення середнього електричного заряду колоїдних часточок і відповідне зниження електрокінетичного  $\zeta$ -потенціалу системи. В результаті таких процесів взаємне відштовхування частинок стає слабкішим і збільшується ймовірність їхніх зіткнень та взаємодії.

Коагуляція золів електролітами відбувається за певними правилами:

1. Всі електроліти при збільшенні їхньої концентрації в золі до деякого значення викликають коагуляцію колоїдних систем. Мінімальна концентрація електроліту, доданого до золю, що викликає швидку коагуляцію за певний час, називається *порогом коагуляції* ( $\gamma$ ).
2. Коагулюючу дію призводить не весь електроліт, а тільки його йон, який має заряд, однотипний із зарядом противойонів міцели. Колоїдні розчини, що містять позитивно заряджені частинки,

коагулюють під дією аніонів, а негативно заряджені колоїдні частинки (гранули) – під дією катіонів.

3. Коагулююча здатність йона залежить від його заряду. Багатозарядні йони викликають коагуляцію при набагато менших концентраціях ( $\gamma$  - найменший поріг коагуляції), ніж йони з малим зарядом, які мають найбільший поріг коагуляції.
4. Згідно правила значущості або правила Шульце-Гарді коагулююча здатність двозарядного йона буде більше в кілька десятків разів більша ніж у однозарядного йона, а тризарядного йона – у кілька сотень разів більша, тому що їх пороги коагуляції відносяться між собою, як:

$$\gamma_1 : \gamma_2 : \gamma_3 = 1 : \left(\frac{1}{2}\right)^6 : \left(\frac{1}{3}\right)^6 = 1 : \frac{1}{64} : \frac{1}{729}$$

5. Коагулююча здатність йонів однакового заряду зростає із збільшенням радіусу йона. Йони органічних сполук завжди маютьвищу коагулюючу здатність, ніж йони неорганічних речовин. При збільшенні концентрації електроліту в розчині зменшується електрокінетичний потенціал колоїдних частинок і коагуляція наступає при його певному значенні – критичному потенціалі. Для більшості систем  $\zeta$ -критичний потенціал дорівнює 0,03.

При змішуванні колоїдних розчинів, що складаються із частинок протилежного заряду, заряди гранул нейтралізуються й відбувається взаємна коагуляція розчинів. Нагрівання зменшує адсорбцію йонів колоїдними частинками, що також приводить до процесу коагуляції.

Процес, обернений коагуляції, називають *пептизацією*. Пептизація має місце при промиванні осадів водою. При цьому йони електроліту-коагулятора вимиваються, частинки осаду знову одержують заряд і переходят у колоїдний розчин.

Така взаємодія колоїдних часточок, відповідно до принципу мінімуму вільної енергії, призводить до їхнього злипання або злиття у випадку рідин, такий процес називають коагуляцією (або коалесценцією для рідин). Якщо частинки укрупнюються, втрачають молекулярно-кінетичні властивості і стають більшими ніж  $10^{-9}$ м, відбувається седиментація (випадіння осаду).

Коагулюючу дію на колоїдну систему з присутніх в розчині різних йонів буде виявляти лише ті йони електроліту, знак електричного заряду яких протилежний знаку заряду колоїдних часточок (або гранули) дисперсної системи. Такі йони називають коагулюючими йонами або йонами-коагуляторами, а електроліт, до складу якого вони входять – електролітом-коагулятором.

Мінімальна концентрація електроліту-коагулятора, що викликає в системі коагуляцію, називається *порогом коагуляції*  $\gamma$  або критичною концентрацією електроліту, яка визначається за формулою:

$$C_{kp} = \frac{C \cdot V_{el} \cdot 1000}{V_{el} + V_3},$$

де  $C_{kp}$  - молярна концентрація еквівалента електроліту, ммоль/дм<sup>3</sup>;  
 $V_{el}$ ;  $V_3$  - відповідно об'єм електроліту та об'єм золю, дм<sup>3</sup>.

Встановлено, що поріг коагуляції обернено пропорційний ступеню електричного заряду (валентності) йонів коагуляторів  $z$  в шостому ступені (рівнянням В. Дерягіна):

$$C_{kp} = \frac{k \cdot T^5}{z^6},$$

де  $T$  – температура колоїдної системи;

$z$  – заряд йонів коагуляторів ;

$k$  – коефіцієнт, який залежить від фізичних властивостей фаз системи.

### 6.3 Приклади розв'язання завдань

Приклад 1. Обчислити питому поверхню частинок золю золота, який отримали в результаті диспергування (подрібнення) 0,5 г золота на частки кулястої форми діаметром  $7,0 \cdot 10^{-9}$  м, густина золота  $\rho = 19320$  кг/м<sup>3</sup>.

*Розв'язання:* Під питомою поверхнею роздрібнених частинок речовини  $S_{пит}$  розуміють сумарну площа поверхні всіх часточок речовини, загальний об'єм яких становить  $1,0 \cdot 10^{-6}$  м<sup>3</sup>. Питома поверхня  $S_{пит}$  дорівнює відношенню площи поверхні подрібнених частинок  $S$  до об'єму подрібненої речовини  $V$ :

$$S_{num} = \frac{S}{V}$$

так як дисперсні частинки мають кулясту форму:

$$S_{num} = \frac{3}{r} \quad \text{або} \quad S_{y\theta} = \frac{6}{D},$$

де  $r$  – радіус сферичних частинок;

$D$  - діаметр кулястої частинки.

Надалі можна визначити об'єм, який займає 0,5 г золота:

$$V = \frac{0,5 \cdot 10^{-3}}{19320} \text{ м}^3 = 2,58 \cdot 10^{-8} \text{ м}^3.$$

Питома поверхня подрібнених сферичних частинок золота дорівнює:

$$S_{пит} = \frac{3}{3,5 \cdot 10^{-9}} \text{ м}^{-1} = 0,86 \cdot 10^9 \text{ м}^{-1}$$


Потім знаходимо загальну площа поверхні часточок золю золота:

$$S \cdot S_{num} V = 0,86 \cdot 10^9 \cdot 2,58 \cdot 10^{-8} = 2,22 \text{ м}^3$$

Приклад 2. Визначення порогу коагуляції – мінімального об'єму електроліту, необхідного для одержання золю сульфату барію.

Який об'єм 0,002 н розчину хлориду барію треба додати до 0,03 дм<sup>3</sup> 0,0006 н сульфату алюмінію, щоб одержати позитивні заряджені частинки золю сульфату барію. Напишіть формулу міцели золю.


*Розв'язання:* Якщо речовини А ( $BaCl_2$ ) взято в надлишку реакція записується таким чином:



Якщо речовини в реакції беруть участь в стехіометричних співвідношеннях, то для повної взаємодії речовин в реакції необхідно взяти такий об'єм хлориду барію:

$$\frac{V_1 C_1 = V_2 C_2}{\frac{3 \cdot 10^{-2} \cdot 6 \cdot 10^{-4}}{2 \cdot 10^{-3}} \text{ дм}^3 = 0,86 \cdot 10^{-3} \text{ дм}^3}$$

Для одержання позитивних часточок золю сульфату барію у розчині повинен бути взятий надлишок хлориду барію в порівнянні із сульфатом алюмінію. Отже, для реакції потрібно взяти надлишок 0,009 дм<sup>3</sup> 0,002 н розчину  $BaCl_2$ , таким чином формула міцели золю сульфату барію буде мати такий вигляд:



Приклад 3. Визначення порогу коагуляції електроліту із врахуванням його концентрації.

В кожну із трьох колб налили 0,01 дм<sup>3</sup> золю хлориду срібла  $AgCl$ . Для коагуляції золю в першу колбу додають 0,002 дм<sup>3</sup> 1 н розчину нітрату натрію  $NaNO_3$ , в другу – 0,012 дм<sup>3</sup> 0,01 н розчину нітрату кальцію  $Ca(NO_3)_2$ , а в третю – 0,007 дм<sup>3</sup> 0,001 н розчину нітрату алюмінію  $Al(NO_3)_3$ . Обчислити пороги коагуляції електролітів та визначте знак заряду частинок золю.

*Розв'язання:* Поріг коагуляції можна обчислити за формулою:

$$C_{kp} = \frac{C \cdot V_{el} \cdot 1000}{V_{el} + V_3},$$

де  $C_{kp}$  - молярна концентрація еквівалента електроліту, ммоль/ дм<sup>3</sup>;  
 $V_{el}$ ;  $V_3$  - відповідно об'єм електроліту та об'єм золю, дм<sup>3</sup>.

Електроліти, які додають до золю, містять нітрат-аніони  $NO_3^-$  та катіони:  $Na^+$ ;  $Ca^{2+}$ ;  $Al^{3+}$ , відповідно до правила Шульце-Гарді найменший поріг коагуляції буде у йона з найбільшим зарядом, тобто у  $Al^{3+}$ . Отже, якщо коагуляцію викликають позитивно заряджені йони, то гранула або

колоїдна часточка має заряд негативний (у йона, що викликає коагуляцію заряд протилежний заряду гранули або колоїдної часточки).

Концентрації електролітів, що викликають коагуляцію розраховують такими чином:

$$C_{NaNO_3} = \frac{1 \cdot 0,002 \cdot 1000}{0,002 + 0,001} = 166,70 \text{ ммоль/дм}^3$$


$$C_{Ca(NO_3)_2} = \frac{0,01 \cdot 0,012 \cdot 1000}{0,012 + 0,001} = 5,45 \text{ ммоль/дм}^3$$

$$C_{Al(NO_3)_3} = \frac{0,001 \cdot 0,007 \cdot 1000}{0,007 + 0,001} = 0,41 \text{ ммоль/дм}^3$$

#### Приклад 4. Визначення заряду колоїдних часточок.

Золь йодиду срібла  $AgI$ , який утворюється при додаванні до  $0,02 \text{ дм}^3$   $0,01 \text{ н}$  розчину йодиду калію  $KI$  та  $0,028 \text{ дм}^3$   $0,005 \text{ н}$  розчином нітрату срібла  $AgNO_3$ . Який заряд мають колоїдні частинки золю. Напишіть формулу його міцели.

*Розв'язання:* Під час хімічної реакції між речовинами, утворюється осад нерозчинного йодиду срібла, який є ядром міцели:



Для визначення кількості реагуючих речовин об'єм розчину необхідно помножити на концентрацію розчину електроліту:

В розчині  $AgNO_3$ :  $0,005 \cdot 0,028 = 1,4 \cdot 10^{-4} \text{ ммоль};$

В розчині  $KI$ :  $0,02 \cdot 0,01 = 2,0 \cdot 10^{-4} \text{ ммоль}.$

Розрахунок показує, що в розчині кількість речовини йодиду калію  $KI$  більше (взято в надлишку), а нітрату срібла  $AgNO_3$  менше (взято в недостачі), отже ядром колоїдних частинок золю йодиду срібла будуть молекули  $AgI$ , на них будуть адсорбуватися йони  $\Gamma$ , які є потенціал-визначальними іонами, які визначають заряд гранули (часточки), тобто колоїдна часточка має негативний заряд. На поверхню такого агрегату адсорбуються противійони  $K^+$ . Тому при надлишку йодиду срібла формула міцели буде мати такий вигляд:

$$\left\{ [(mAgI) \cdot n\Gamma]^{n-} \cdot (n-x)K^+ \right\}^{x-} \cdot xK^+$$

$$\left\{ [(mAgI) \cdot n\Gamma \cdot (n-x)K^+]^- \cdot xK^+ \right\}$$

Приклад 5. Ізоелектричний стан міцели, визначення потенціал - визначальних йонів та противойонів міцели (дивись попередню реакцію).

*Розв'язання:*

$$\{[(AgI)_m \cdot n\Gamma \cdot (n-x)K^+]^- \cdot xK^+\}$$

У випадку коли концентрації обох електролітів рівними, міцела буде знаходитися в *ізоелектричному стані*, який можна записати міцелярною формулою наступного вигляду:

$$\{[(mAgI) \cdot n\Gamma \cdot nK^+]\}^0$$

$(mAgI)$  – ядро міцели гідрозоля йодиду срібла;

$[(mAgI) \cdot n\Gamma]^-$  - агрегат;

$[(mAgI) \cdot n\Gamma \cdot nK^+]$  - гранула немає заряду і є міцелою;

$n\Gamma$  - потенціал-визначальні йони;

$nK^+$  - противийони адсорбційного шару.

В такому випадку повністю відсутні противойони дифузійного шару, тому при електрофорезі під дією електричного поля колоїдна часточка не буде рухатися, так як немає електричного заряду.

## Розділ 7 ОСНОВИ БІОГЕОХІМІЇ

Почати вивчення теми слід з понять, термінів та історії формування науки, ролі В.І. Вернадського в цьому процесі. Розглянути вчення про біосферу в розумінні В.І. Вернадського та сучасних поглядів про склад та фізико-хімічну характеристику біосфери. Мати чітке поняття про живу речовину її властивості, функції; органічні речовини та їх трансформацію. Роль ґрунтів та його внесок в розвиток біосфери; міграцію речовин, її типи; біогеохімічні функції живої речовини.

Розглянути фактори, що впливають на хімічний склад рослин, бар'єрні та безбар'єрні організми. Біологічний кругообіг речовин, як форма розвитку планети. Загальні закономірності біогеохімічного кругообігу речовин. Поняття про ноосферу та техногенна міграція елементів. [2]

### 7.1 Теоретичні положення

**Біогеохімія** - порівняно молода наука. Так, у «Великій Радянській Енциклопедії» (1 вид., 1927) є перше згадування про неї. У тій же енциклопедії є пояснення терміну «геохімія»: «Нова наукова дисципліна, що розглядається як історія хімічних елементів Землі» (Ферсман, 1929).

Історію встановлення біогеохімії розглянути самостійно [2] С.5-23.

**Біогеохімія** - це частина геохімії, що вивчає геохімічні процеси, що відбуваються в біосфері при участі живої речовини.

Досить важко розрізнати поняття «геохімія» і «біогеохімія», оскільки розходження між ними зводяться тільки до того, чи беруть участь живі організми в долі атомів хімічних елементів на Землі, чи ні.

Методологічною основою біогеохімії, за І.І. Дедю (Екологічний енциклопедичний словник, 1989), є розроблені в 1924 році В.І. Вернадським принципи взаємодії між живою і неживою речовиною. Ці принципи визначають фундаментальні закони, що керують геохімічною діяльністю живих організмів у біосфері. Зводяться вони до наступного:

1. Біогенна міграція атомів хімічних елементів у біосфері завжди прагне до максимального свого прояву;
2. Еволюція видів, у ході геологічного часу, що приводить до створення, форм життя, йде в напрямку, що збільшує біогенну міграцію атомів у біосфері.

Завдяки роботам В.І. Вернадського виявлено винятково важлива роль живої речовини в міграції хімічних елементів і термодинаміці планети в цілому.

У глобальному масштабі геохімічну роль живої речовини слід розглядати як могутній історично сформований геологічний фактор масо- і енергопереносу. Саме біогеохімічна енергія живої речовини - основний рушійний фактор розвитку процесів у біосфері. А.І. Перельман (1989), вказує на 3 аспекти геохімічної діяльності живих організмів.

1. Живі організми безпосередньо концентрують окремі елементи або групи елементів. В результаті селективного концентрування після відмирання живих організмів відбувається утворення гірських порід з органоморфною структурою і текстурою - вугілля, торф, сапропеліт, коралові вапняки і т.д. *Жива речовина* - найсильніший фактор міграції елементів в екосистемах.
2. Діяльність живої речовини - найважливіший фактор міграції елементів за час геологічної історії Землі, що визначає всю геохімію земної кори. Результатом життєдіяльності живих організмів за мільярди років став біогеохімічний кругообіг і диференціація елементів, що створили біосферу і є основою її функціонування.
3. В даний час кругообіг речовин в природі визначається спільною дією біологічних, геохімічних та геофізичних факторів. Господарська діяльність людини привела до того, що антропогенний фактор зрівнявся з природним біогеохімічним фактором міграції речовин, а в деяких ланцюгах природних кругообігів став головним. Всі ці аспекти діяльності живих організмів і вивчає біогеохімія

**Біогеохімія** - комплексна дисципліна, що вивчає хімічний склад живих організмів та їх участь в геохімічних процесах, що відбуваються в біосфері Землі.

В розумінні В.І.Вернадського «жива речовина» - це сукупність організмів планети, або якась її частина виражена в одиницях маси, енергії, інформації.

Вивчаючи живу речовину вчений підійшов до аналізу будови тієї оболонки Землі, в межах якої існує жива речовина – біосфера. Він визначив межі біосфери, включивши до неї всю гідросферу, нижню частину атмосфери та верхню частину літосфери. Він визначив загальну масу живої речовини біосфери і закономірності її розподілу в просторі, виділив плівки згущення живої речовини, які відповідають ґрутовому шару на суші та декільком верхнім метрам води в океані. Він започаткував вивчення циклів хімічних елементів, які проходять через живу речовину біосфери.

Термін «біосфера» був введений в науку Зюссом (1873р.) в його визначенні це сфера проживання живих організмів, або сфера заповнена життям. В.І. Вернадський таке розуміння біосфери розвинув як поняття планетарного середовища, в якому тільки і можливе життя та відбуваються всі біогеохімічні явища. Між неживою частиною біосфери, неживими природними тілами та живою речовиною, що її населяє йде безперервний матеріальний та енергетичний обмін, що виражається в русі атомів викликаному живою речовиною.

В цьому біогенному потоці атомів і зв'язаною з ним енергією проявляється планетарне, космічне значення живої речовини. Тому, що біосфера це єдина земна оболонка, в яку безперервно проникає космічна енергія, космічне випромінювання Сонця, за рахунок чого підтримується динамічна рівновага : біосфера – жива речовина.

В 1926 році в своїй книзі «Біосфера» В.І. Вернадський виклав **6 емпіричних узагальнень**, які розкривають роль живої речовини в геологічній історії Землі:

1. Сучасна жива речовина знаходиться в генетичному зв'язку з живою речовиною минулого. Умови земного середовища доступні для існування живої речовини та її хімічного впливу на навколошнє середовище.
2. В усі відомі геологічні періоди незмінно витримується принцип Реді (1712р.) – «все живе від живого».
3. Променева енергія Сонця регулює хімічний прояв земної кори через посередню дію живих організмів.
4. Історія Землі демонструє принцип Геттона (1796) – «в геології немає ні початку, ні кінця».
5. Існування біосфери на планеті неперервне в часі (принцип актуалізму).
6. Еволюційний процес має спрямованість (принцип Дана (1863)).

Біосфера впливає на природу не тільки планети, але і космос.

1. Космічне випромінювання, що йде від небесних тіл, пронизує біосферу, яка є областю перетворення космічної енергії.
2. Вивчення життя в формі живої речовини вказує, що це є планетне явище космічного характеру.
3. Жива речовина є перш за все планетне явище і не може бути відірвана від біосфери, геологічною функцією якої вона являється.

В цих положеннях В.І. Вернадського чітко сформульовано, що біосфера повинна розглядатися і як земна природа, і як планетне явище космічного характеру.

Сучасні дослідження показують, що верхня межа розповсюдження живих організмів визначається згубною дією радіації. Нижні температури верхніх шарів тропосфери, навпаки, вивчають захисну дію, так як життєздатність мікроорганізмів зберігається довше при низьких температурах. Так званий аеропланктон населяє всю тропосферу, в тропопаузі умови такі, що мікроорганізми існувати не можуть.

Ясного уявлення про нижню межу біосфери до цих пір немає. Можливо, що на континентах нижня межа існування життя знаходиться десь на глибині 2-3 км. На таких глибинах виявлені пурпурні тіоново-кислі бактерії, які використовують вільний кисень, що виділяється при розкладі води нафтових родовищ під дією випромінювання радію. А також термофільні, існуючі при  $\sim 104^{\circ}\text{C}$ , сульфатвідновлюючі бактерії.

Структура біосфери, вертикальна ярусність, природні комплекси океанічні та континентальні областях [2] – С.23-34

Хімічний склад рослин, бар'єрні та безбар'єрні організми. Біологічний кругообіг речовин, як форма розвитку планети. Загальні закономірності біогеохімічного кругообігу речовин. Поняття про ноосферу та техногенна міграція елементів [2]

## 7.2 Завдання до виконання контрольної роботи з модуля 4 (теоретичного)

**31 а.** Розрахувати електродний потенціал магнію в розчині його солі при концентрації 0,01 моль/дм<sup>3</sup>. Визначити який з металів можна використовувати як катод, якщо анодом в гальванічній парі буде електрод з марганцю. Надати необхідні розрахунки і пояснення для стандартних умов і при концентрації солей 0,01 моль/дм<sup>3</sup>; записати рівняння анодних і катодних процесів; розрахувати ЕРС двох таких гальванічних елементів.

**31 б.** Складіть рівняння електродних процесів, які відбуваються при електролізі водного розчину та розплаву сульфату алюмінію біля:  
а) інертного аноду; б) мідного аноду. Розрахуйте маси та об'єми утворених продуктів.

**31 в.** При додаванні надлишку сірководню в розчин солі миш'яку (III)

$\text{AsCl}_3$  одержали золь сульфіду миш'яку. Напишіть рівняння реакцій, формулу міцели золю й визначте знак його заряду. Розрахуйте для них пороги коагуляції  $\gamma$ .

**31 г.** Роль В.І. Вернадського, його сучасників та послідовників у становленні біогеохімії.

**32 а.** Розрахувати електродний потенціал берилію в розчині його солі при концентрації 0,001 моль/дм<sup>3</sup>. Визначити який з металів можна використовувати як катод, якщо анодом в гальванічній парі буде електрод з кадмієм. Надати необхідні розрахунки і пояснення для стандартних умов і при концентрації солей 0,001 моль/дм<sup>3</sup>; записати рівняння анодних і катодних процесів; розрахувати ЕРС двох таких гальванічних елементів.

**32 б.** Складіть рівняння електродних процесів, які відбуваються при електролізі водного розчину та розплаву сульфату міді при: а) інертному аноді; б) мідному аноді. Розрахуйте маси та об'єми утворених продуктів.

**32 в.** Золь кремнієвої кислоти  $\text{H}_2\text{SiO}_3$  був одержаний при взаємодії розчинів  $\text{K}_2\text{SiO}_3$  та  $\text{HCl}$ . Напишіть рівняння реакцій, формулу міцели золю й визначте, який з електролітів був у надлишку, якщо противоіони в електричному полі рухаються до катоду.

**32 г.** Дати визначення біосфери. Описати її структуру, властивості та межі

**33 а.** Розрахувати електродний потенціал хрому в розчині його солі при концентрації 0,0001 моль/дм<sup>3</sup>. Визначити який з металів можна використовувати як катод, якщо анодом в гальванічній парі буде електрод з алюмінієм. Надати необхідні розрахунки і пояснення для стандартних умов і при концентрації солей 0,01 моль/дм<sup>3</sup>; записати рівняння анодних і катодних процесів; розрахувати ЕРС двох таких гальванічних елементів.

**33 б.** Складіть рівняння електродних процесів, які відбуваються при електролізі водного розчину та розплаву нітрату алюмінію біля: а) інертного аноду; б) залізного аноду. Розрахуйте маси та об'єми утворених продуктів.

**33 в.** Напишіть формулу міцели золю золота (ядро колоїдної частки містить  $m[\text{Au}]$ ), одержаного розпиленням золота в розчині  $\text{NaAuO}_2$ . Надати необхідні пояснення, записати рівняння процесів.

**33 г.** Сучасний етап розвитку біосфери. Можливі шляхи оптимізації переходу біосфери в ноосферу.

**34 а.** Розрахувати електродний потенціал алюмінію в розчині його солі при концентрації 0,1 моль/дм<sup>3</sup>. Визначити який з металів можна використовувати як катод, якщо анодом в гальванічній парі буде електрод з срібла. Надати необхідні розрахунки і пояснення для стандартних умов і при концентрації солей 0,1 моль/дм<sup>3</sup>; записати рівняння анодних і катодних процесів; розрахувати ЕРС двох таких гальванічних елементів.

**34 б.** Складіть рівняння електродних процесів, які відбуваються при електролізі водного розчину та розплаву карбонату натрію біля:  
а) інертного аноду; б) цинкового аноду. Розрахуйте маси та об'єми утворених продуктів.

**34 в.** Складіть рівняння реакцій в молекулярній і йонній формах, формулу міцели золю гідроксиду алюмінію, одержаного при глибокому гідролізі сульфату алюмінію. Надати необхідні пояснення.

**34 г.** Роль живої речовини в геологічній історії розвитку Землі

**35 а.** Розрахувати електродний потенціал золота в розчині його солі при концентрації 0,00001 моль/дм<sup>3</sup>. Визначити який з металів можна використовувати як катод, якщо анодом в гальванічній парі буде електрод з нікелю. Надати необхідні розрахунки і пояснення для стандартних умов і при концентрації солей 0,01 моль/дм<sup>3</sup>; записати рівняння анодних і катодних процесів; розрахувати ЕРС двох таких гальванічних елементів.

**35 б.** Як протікає атмосферна корозія заліза, якщо воно вкрите шаром нікелю, якщо воно немає пошкоджень та якщо зруйновано? Складіть рівняння анодних і катодних процесів електрохімічної корозії.

**35 в.** При досить повільному додаванні кислої солі  $KH_2SbO_4$  у розведений розчин солі хлориду натрію можливе утворення гідрозоля кислої солі  $NaH_2SbO_4$ . Напишіть рівняння реакцій в молекулярній і йонній формах, формулу міцели і вкажіть знак електричного заряду колоїдних частинок цього золю. Яка з рекомендованих речовин є найбільш економічним коагулятором цього золю:  $NH_4Cl$ ,  $K_2SO_4$ ,  $FeCl_3$ ? Які ще є можливості для відділення кислої солі  $NaH_2SbO_4$  від рідини?

**35 г.** Опишіть функції живої речовини. Наведіть приклади.

**36 а.** Розрахувати електродний потенціал стануму в розчині його солі при концентрації 0,01 моль/дм<sup>3</sup>. Визначити який з металів можна використовувати як катод, якщо анодом в гальванічній парі буде електрод з хрому. Надати необхідні розрахунки і пояснення для стандартних умов і при концентрації солей 0,01 моль/дм<sup>3</sup>; записати рівняння анодних і катодних процесів; розрахувати ЕРС двох таких гальванічних елементів.

**36 б.** Як впливає pH середовища на швидкість корозії заліза і цинку, якщо ці металу контактиують та якщо не мають контакту? Напишіть рівняння корозії цих металів в кислому і нейтральному середовищах.

**36 в.** При досить повільному введенні солі нітрату срібла у розведений розчин солі йодиду натрію можливе утворення гідрозоля йодиду срібла. Напишіть рівняння реакцій, формули міцел і вкажіть знак електричного заряду колоїдних часток цього золю. Яка з рекомендованих речовин є найбільш економічним коагулятором цього золю:  $NaF$ ,  $Ca(NO_3)_2$ ,  $K_2SO_4$ ? Які ще є можливості для відділення солі йодиду срібла від рідини?

**36 г.** Поняття про біогеоценоз, як елементарну структурну одиницю біосфери.

**37 а.** Розрахувати електродний потенціал титану в розчині його солі при концентрації 0,0001 моль/дм<sup>3</sup>. Визначити який з металів можна використовувати як катод, якщо анодом в гальванічній парі буде електрод з хрому. Надати необхідні розрахунки і пояснення для стандартних умов і при концентрації солей 0,0001 моль/дм<sup>3</sup>; записати рівняння анодних і катодних процесів; розрахувати ЕРС двох таких гальванічних елементів.

**37 б.** В чому сутність протекторного захисту металів від електрохімічної корозії? Складіть рівняння анодних і катодних процесів, які відбуваються якщо протектором є цинк і мідь, для яких металів вони можуть бути протекторами?

**37 в.** При досить повільному введенні гідроксиду натрію у розведений розчин солі хлориду магнію можливе утворення гідрозоля гідроксиду магнію. Напишіть рівняння реакцій, формули міцел і вкажіть знак електричного заряду колоїдних часток цього золю. Яка з рекомендованих речовин є найбільш економічним коагулятором цього золю:  $KCl$ ,  $AlCl_3$ ,  $Zn(CH_3COO)_2$ ? Розрахуйте для них пороги коагуляції  $\gamma$ . Надати необхідні пояснення.

**37 г.** Дайте визначення ноосфери, вкажіть її ознаки та властивості. Чим обумовлені основні відмінності ноосфери від біосфери?

**38 а.** Розрахувати електродний потенціал цинку в розчині його солі при концентрації 0,1 моль/дм<sup>3</sup>. Визначити який з металів можна використовувати як катод, якщо анодом в гальванічній парі буде електрод з цинку. Надати необхідні розрахунки і пояснення для стандартних умов і при концентрації солей 0,1 моль/дм<sup>3</sup>; записати рівняння анодних і катодних процесів; розрахувати ЕРС двох таких гальванічних елементів.

**38 б.** Чому мідь не витісняє водень із розбавлених розчинів кислот? Але при контакті міді з цинком на міді починається бурхливе виділення водню. Напишіть рівняння анодних і катодних процесів в кислому середовищі.

**38 в.** При досить повільному введенні солі нітрату срібла у розведений розчин солі роданіду амонію можливе утворення гідрозоля роданіду срібла. Напишіть рівняння реакцій, формулу міцели і вкажіть знак електричного заряду колоїдних часток цього золю. Яка з речовин  $KCl$ ,  $Na_2SO_4$ ,  $K_3PO_4$  є найбільш економічним коагулятором золю? Які ще є можливості для відділення солі роданіду срібла від рідини?

**38 г.** Біогеохімічні функції живої речовини (газові, концентраційні, окисно-відновні, біохімічні).

**39 а.** Розрахувати електродний потенціал купруму в розчині його солі при концентрації 0,001 моль/дм<sup>3</sup>. Визначити який з металів можна

використовувати як катод, якщо анодом в гальванічній парі буде електрод з марганцю. Надати необхідні розрахунки і пояснення для стандартних умов і при концентрації солей 0,001 моль/дм<sup>3</sup>; записати рівняння анодних і катодних процесів; розрахувати ЕРС двох таких гальванічних елементів.

**39 б.** Якщо на поверхню сталі нанести краплину води, то корозії підлягає середня, а не зовнішня частина заліза. Як це можна пояснити? Складіть рівняння анодного і катодного процесів.

**39 в.** При досить повільному введенні  $PbSO_4$  у розведений розчин солі  $CaCl_2$  можливе утворення гідрозоля  $CaSO_4$ . Напишіть рівняння реакцій, формулу міцели і вкажіть знак електричного заряду колоїдних часток цього золю. Яка з рекомендованих речовин є найбільш економічним коагулятором цього золю:  $ZnCl_2$ ,  $AlCl_3$ ,  $CH_3COONa$ ? Надати необхідні пояснення.

**39 г.** Класи бар'єрів. Геохімічні бар'єри. Класифікація геохімічних бар'єрів по накопиченню хімічних елементів та за масштабністю. Особливості фізико-хімічних бар'єрів

**40 а.** Розрахувати електродний потенціал кальцію в розчині його солі при концентрації 0,01 моль/дм<sup>3</sup>. Визначити який з металів можна використовувати як катод, якщо анодом в гальванічній парі буде електрод з олова. Надати необхідні розрахунки і пояснення для стандартних умов і при концентрації солей 0,01 моль/дм<sup>3</sup>; записати рівняння анодних і катодних процесів; розрахувати ЕРС двох таких гальванічних елементів.

**40 б.** Як протікає корозія заліза у вологому повітрі, якщо залізо вкрите шаром олова, марганцю? Надати пояснення та записати рівняння процесів, що відбуваються при атмосферній корозії.

**40 в.** При досить повільному введенні  $CaSO_4$  у розведений розчин солі  $BaCl_2$  можливе утворення гідрозоля  $BaSO_4$ . Напишіть рівняння реакцій, формулу міцели і вкажіть знак електричного заряду колоїдних часток цього золю. Яка з рекомендованих речовин є найбільш економічним коагулятором цього золю:  $NH_4Cl$ ,  $AlCl_3$ ,  $CH_3COOK$ ? Надати необхідні пояснення. Розрахувати пороги коагуляції  $\gamma$ .




**40 г.** Поняття про біологічний кругообіг речовин. Елементи та параметри біогеохімічного кругообігу речовин в природі.

### 7.3 Завдання до виконання контрольної роботи з модуля 5 (практичного)

**41 а.** Складіть електронні рівняння, визначте окисник і відновник. Розставте коефіцієнти в рівнянні реакції методом йонно-електронного балансу. Розрахуйте яку масу окисника необхідно взяти для реакції, якщо маса відновника дорівнює 15 г.




**41 б.** Дайте назву органічним сполукам згідно з номенклатурою IUPAC; до якого класу органічних сполук відносяться ці речовини, напишіть можливі ізомери та формули двох членів даного гомологічного ряду





**41 в.** Розрахуйте відсотковий за масою вміст  $\text{Ca}$  та його оксиду  $\text{CaO}$  в природному силікаті - азбесті, формула якого –  $\text{CaMg}_3\text{Si}_4\text{O}_{12}$ .

**42 а.** Виходячи з ступеня окиснення брому у сполуках – кислотах:  $\text{HBr}$ ;  $\text{HBrO}_3$ ;  $\text{HBrO}_4$  визначте яка з цих кислот є тільки окисником, яка тільки відновником, а яка може виявляти властивості окисника і відновника. Надати пояснення. Розрахуйте яку масу окисника необхідно взяти для реакції, якщо маса відновника дорівнює 25 г. Розставити коефіцієнти в рівнянні реакції, що відбувається за схемою:



**42 б.** Дайте назву органічним сполукам згідно з номенклатурою IUPAC; до якого класу органічних сполук відносяться ці речовини, напишіть можливі ізомери та формули двох членів даного гомологічного ряду






**42 в.** Розрахуйте відсотковий за масою вміст  $\text{Mg}$  та його оксиду  $\text{MgO}$  в природному силікаті - азбесті, формула якого –  $\text{CaMg}_3\text{Si}_4\text{O}_{12}$ .

**43 а.** Складіть електронні рівняння, визначте окисник і відновник, назвіть які реакції відносяться до окиснення, а які до відновлення. Розставте коефіцієнти в рівнянні реакції методом йонно-електронного балансу. Розрахуйте яку масу окисника необхідно взяти для реакції, якщо маса відновника дорівнює 5 г.




**43 б.** Дайте назву органічним сполукам згідно з номенклатурою IUPAC; до якого класу органічних сполук відносяться ці речовини, напишіть можливі ізомери та формули двох членів даного гомологічного ряду




**43 в.** Розрахуйте відсотковий за масою вміст  $\text{K}$  та його оксиду  $\text{K}_2\text{O}$  в природному силікаті - біла слюда, формула якого -  $\text{H}_4\text{K}_2\text{Al}_6\text{Si}_6\text{O}_{24}$ .

**44 а.** Складіть електронні рівняння, визначте окисник і відновник, назвіть які реакції відносяться до окиснення, а які до відновлення. Розрахуйте яку масу окисника необхідно взяти для реакції, якщо маса відновника дорівнює 85 г. Розставте коефіцієнти в рівнянні реакції методом йонно-електронного балансу:




**44 б.** Дайте назву органічним сполукам згідно з номенклатурою IUPAC; до якого класу органічних сполук відносяться ці речовини, напишіть можливі ізомери та формули двох членів даного гомологічного ряду




**44 в.** Розрахуйте відсотковий за масою вміст  $Al$  та його оксиду  $Al_2O_3$  в природному силікаті біла слюда, формула якого -  $H_4K_2Al_6Si_6O_{24}$ .

**45 а.** Складіть електронні рівняння, визначте окисник і відновник, назвіть які реакції відносяться до окиснення, а які до відновлення. Розрахуйте яку масу окисника необхідно взяти для реакції, якщо маса відновника дорівнює 55 г. Розставте коефіцієнти в рівнянні реакції методом йонно-електронного балансу:



**45 б.** Дайте назву органічним сполукам згідно з номенклатурою IUPAC; до якого класу органічних сполук відносяться ці речовини, напишіть можливі ізомери та формули двох членів даного гомологічного ряду





**45 в.** Розрахуйте відсотковий за масою вміст  $Si$  та його оксиду  $SiO_2$  в природному силікаті - біла слюда, формула якого -  $H_4K_2Al_6Si_6O_{24}$

**46 а.** Складіть електронні рівняння, визначте окисник і відновник, назвіть які реакції відносяться до окиснення, а які до відновлення. Розставте коефіцієнти в рівнянні реакції методом йонно-електронного балансу. Розрахуйте яку масу окисника необхідно взяти для реакції, якщо маса відновника дорівнює 45 г.



**46 б.** Дайте назву органічним сполукам згідно з номенклатурою IUPAC; до якого класу органічних сполук відносяться ці речовини, напишіть можливі ізомери та формули двох членів даного гомологічного ряду





**46 в.** Розрахуйте відсотковий за масою вміст *Si* та його оксиду  $\text{SiO}_2$  в природному силікаті каолін, формула якого -  $\text{H}_4\text{Al}_2\text{Si}_2\text{O}_9$ .

**47 а.** Складіть електронні рівняння, визначте окисник і відновник, назвіть які реакції відносяться до окиснення, а які до відновлення. Розрахуйте яку масу окисника необхідно взяти для реакції, якщо маса відновника дорівнює 35 г. Розставте коефіцієнти в рівнянні реакції методом йонно-електронного балансу:




**47 б.** Дайте назву органічним сполукам згідно з номенклатурою IUPAC; до якого класу органічних сполук відносяться ці речовини, напишіть можливі ізомери та формули двох членів даного гомологічного ряду




**47 в.** Розрахуйте відсотковий за масою вміст *Si* та його оксиду  $\text{SiO}_2$  в природному силікаті - азбесті, формула якого –  $\text{CaMg}_3\text{Si}_4\text{O}_{12}$ .

**48 а.** Виходячи із ступеня окиснення хлору у сполуках: хлоридна кислота, хлорнувата кислота, хлорна кислота визначте яка з цих кислот є тільки окисником, яка тільки відновником, а яка може виявляти властивості окисника і відновника. Надати пояснення. Розрахуйте яку масу окисника необхідно взяти для реакції, якщо маса відновника дорівнює 25 г. Розставити коефіцієнти в рівнянні реакції, що відбувається за схемою:



**48 б.** Дайте назву органічним сполукам згідно з номенклатурою IUPAC; до якого класу органічних сполук відносяться ці речовини, напишіть можливі ізомери та формули двох членів даного гомологічного ряду



**48 в.** Розрахуйте масу нітрогену, що міститься в 1кг амофосу  $(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$ .


**49 а.** Виходячи із ступеня окиснення Сульфуру у сполуках: сульфатна кислота, сульфітна кислота, сульфідна кислота визначте яка з цих кислот є

тільки окисником, яка тільки відновником, а яка може виявляти властивості окисника і відновника. Розрахуйте яку масу окисника необхідно взяти для реакції, якщо маса відновника дорівнює 15 г. Надати пояснення. Розставити коефіцієнти в рівнянні реакції, що відбувається за схемою:



**49 б.** Дайте назву органічним сполукам згідно з номенклатурою IUPAC; до якого класу органічних сполук відносяться ці речовини, напишіть можливі ізомери та формули двох членів даного гомологічного ряду

- 1)  $\text{BrCH}_2\text{-CH}_2\text{-CHCl-C}\equiv\text{CH}$     2)  $(\text{CH}_3)_5\text{-CH=CH-CH}_3$     3)



**49 в.** Розрахуйте масу нітрогену, що міститься в 1кг аміачної селітри  $NH_4NO_3$ .

**50 а.** Виходячи із ступеня окиснення нітрогену у сполуках: нітратна кислота, нітритна кислота, амоніак визначте яка з цих сполук є тільки окисником, яка тільки відновником, а яка може виявляти властивості окисника і відновника. Надати пояснення. Розрахуйте яку масу окисника необхідно взяти для реакції, якщо маса відновника дорівнює 75 г. Розставити коефіцієнти в рівнянні реакції, що відбувається за схемою:



**50 б.** Дайте назву органічним сполукам згідно з номенклатурою IUPAC; до якого класу органічних сполук відносяться ці речовини, напишіть можливі ізомери та формули двох членів даного гомологічного ряду

- 1)  $\text{CH}_3\text{-CH=CH-CH}_2\text{-CH}_2\text{Cl}$     2)  $\text{CH}_3\text{-CH-CH}_2\text{-CH}_3$     3)  $\text{CH}_2\text{Br}_2$



**50 в.** Обчислити масову частку Натрію і Силіцію та їх оксидів в мінералі нефеліні:  $K_2Na_2Al_2Si_2O_8$ .

## ДОДАТКИ

**Додаток 1 – Електронегативність елементів (за Полінгом)**

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII			
1	<b>H</b> 2.1										<b>He</b> -
2	<b>Li</b> 1.0	<b>Be</b> 1.5	<b>B</b> 2.0	<b>C</b> 2.5	<b>N</b> 3.0	<b>O</b> 3.5	<b>F</b> 4.0				<b>Ne</b> -
3	<b>Na</b> 0.9	<b>Mg</b> 1.2	<b>Al</b> 1.5	<b>Si</b> 1.8	<b>P</b> 2.1	<b>S</b> 2.6	<b>Cl</b> 3.0				<b>Ar</b> -
4	<b>K</b> 0.8	<b>Ca</b> 1.0	<b>Sc</b> 1.3	<b>Ti</b> 1.5	<b>V</b> 1.6	<b>Cr</b> 1.6	<b>Mn</b> 1.5	<b>Fe</b> 1.8	<b>Co</b> 1.9	<b>Ni</b> 1.9	
	<b>Cu</b> 1.9	<b>Zn</b> 1.6	<b>Ga</b> 1.6	<b>Ge</b> 1.8	<b>As</b> 2.0	<b>Se</b> 2.4	<b>Br</b> 2.8				<b>Kr</b> -
5	<b>Rb</b> 0.8	<b>Sr</b> 1.0	<b>Y</b> 1.2	<b>Zr</b> 1.4	<b>Nb</b> 1.6	<b>Mo</b> 1.8	<b>Tc</b> 1.9	<b>Ru</b> 2.2	<b>Rh</b> 2.2	<b>Pd</b> 2.2	
	<b>Ag</b> 1.9	<b>Cd</b> 1.7	<b>In</b> 1.7	<b>Sn</b> 1.8	<b>Sb</b> 1.9	<b>Te</b> 2.1	<b>I</b> 2.5				<b>Xe</b> -
6	<b>Cs</b> 0.7	<b>Ba</b> 0.9	<b>La*</b> 1.08	<b>Hf</b> 1.3	<b>Ta</b> 1.5	<b>W</b> 1.7	<b>Re</b> 1.9	<b>Os</b> 2.2	<b>Ir</b> 2.2	<b>Pt</b> 2.2	
	<b>Au</b> 2.4	<b>Hg</b> 1.9	<b>Tl</b> 1.8	<b>Pb</b> 1.9	<b>Bi</b> 2.0	<b>Po</b> 2.0	<b>At</b> 2.2				<b>Rn</b> -
7	<b>Fr</b> 0.7	<b>Ra</b> 0.9	<b>Ac**</b> 1.1	*Лантаноїди 1.08-1.14 **Актиноїди 1.11-1.2							

**Додаток 2 – Деякі константи комплексних йонів**

Комплекс. йон	$K_h$	$\beta$	Комплекс. йон	$K_h$	$\beta$
$[\text{Ag}(\text{CN})_2]^{2-}$	$1 \cdot 10^{-21}$		$[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$	$1 \cdot 10^{-37}$	$1 \cdot 10^{24}$
$[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$	$7 \cdot 10^{-8}$		$[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$	$1 \cdot 10^{-44}$	$1 \cdot 10^{31}$
$[\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_2]^{3-}$	$1 \cdot 10^{-14}$		$[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$	$1 \cdot 10^{-3}$	$1 \cdot 10^{24}$
$[\text{Ag}(\text{NO}_2)_2]^-$	$1,3 \cdot 10^{-3}$		$[\text{Fe}(\text{CNS})_4]^-$		$7,1 \cdot 10^{24}$
$[\text{CdCl}_4]^{2-}$	$9 \cdot 10^{-33}$		$[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$	$3 \cdot 10^{-16}$	$1 \cdot 10^{30}$
$[\text{CdI}_4]^{2-}$	$8 \cdot 10^{-7}$		$[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$	$2 \cdot 10^{-9}$	$1 \cdot 10^{22}$
$[\text{Cd}(\text{CN})_4]^{2-}$	$1 \cdot 10^{-17}$		$[\text{Zn}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$	$4 \cdot 10^{-10}$	$1 \cdot 10^{22}$
$[\text{Cd}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$	$8 \cdot 10^{-8}$		$[\text{Zn}(\text{CN})_4]^{2-}$	$2 \cdot 10^{-17}$	$1,2 \cdot 10^{16}$
$[\text{Cd}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$	$8 \cdot 10^{-68}$		$[\text{Zn}(\text{OH})_4]^{2-}$		$1,4 \cdot 10^{15}$
$[\text{Co}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$	$8 \cdot 10^{-6}$	$1,17 \cdot 10^7$	$[\text{Pt}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$	$5 \cdot 10^{-34}$	
$[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$	$6 \cdot 10^{-36}$	$3,2 \cdot 10^{32}$	$[\text{HgS}_2]^{2-}$	$1 \cdot 10^{-53}$	
$[\text{Co}(\text{CN})_4]^{2-}$	$8 \cdot 10^{-20}$		$[\text{Hg}(\text{CN})_4]^{2-}$	$4 \cdot 10^{-42}$	
$[\text{Co}(\text{NCS})_3]^-$		63,1	$[\text{Hg}(\text{CNS})_4]^{2-}$	$1 \cdot 10^{-22}$	
$[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$	$2 \cdot 10^{-13}$	$4,8 \cdot 10^{12}$	$[\text{HgCl}_4]^{2-}$	$8 \cdot 10^{-16}$	
$[\text{Cu}(\text{CN})_2]^-$		$1,1 \cdot 10^{24}$	$[\text{HgI}_4]^{2-}$	$1 \cdot 10^{-30}$	
$[\text{Cu}(\text{CNS})_4]^{2-}$		$3,31 \cdot 10^6$	$[\text{HgBr}_4]^{2-}$	$1 \cdot 10^{-21}$	

### Додаток 3 – Напрямок перебігу реакцій

Знак функції			Можливість процесу
$\Delta H$	$\Delta S$	$\Delta G$	
-	+	-	Можливо при будь-яких температурах
+	-	+	Неможливо при будь-яких температурах
-	-	$\pm$	Можливо при досить низьких температурах
+	+	$\pm$	Можливо при досить високих температурах

### Додаток 4 – Стандартні енталпії утворення $\Delta H^\circ_{298}$ , ентропії $S^\circ_{298}$ та вільна енергія утворення $\Delta G^\circ_{298}$ деяких речовин та йонів при 298 К (25°C)

Речовина	$\Delta H^\circ_{298}$ кДж/молін	$S^\circ_{298}$ Дж/(моль·К)	$\Delta G^\circ_{298}$ кДж/молін	Речовина	$\Delta H^\circ_{298}$ кДж/молін	$S^\circ_{298}$ Дж/(моль·К)	$\Delta G^\circ_{298}$ кДж/молін
$\text{Al}_2\text{O}_3$ (к.)	-1676,0	50,9	-1582,0	$\text{TiO}_2$ (к.)	-943,9	50,3	-888,6
$\text{CH}_4$ (г.)	-74,9	186,2	-50,8	$\text{SO}_2$ (г.)	-296,9	248,1	-300,2
$\text{C}_2\text{H}_4$ (г.)	52,3	219,4	68,1	$\text{SO}_3$ (г.)	-394,8	256,0	-370,0
$\text{C}_2\text{H}_2$ (г.)	+226,8	200,8	+209,2	$\text{PCl}_5$ (г.)	-369,45	362,9	-324,55
$\text{C}_2\text{H}_6$ (г.)	-89,7	229,5	-167,9	$\text{PCl}_3$ (г.)	-277,0	311,7	-286,27
$\text{C}_6\text{H}_6$ (р.)	82,9	269,2	129,7	$\text{ZnO}$ (к.)	-350,6	43,6	-320,7
$\text{C}_3\text{H}_8$ (г.)	-103,85	269,87	-	$\text{ZnS}$ (к.)	-205,4	57,74	-200,7
$\text{C}_4\text{H}_{10}$ (г.)	-30,15	296,12	-4,10	$\text{Na}_2\text{O}$ (к.)	-416,0	75,21	-377,1
$\text{CCl}_4$ (г.)	-102,93	309,74	-60,63	$\text{Na}_2\text{SiO}$ (к.)	-1525,4	113,8	-1427,7
$\text{CS}_2$	88,7	151,0	64,4	$\text{SiO}_2$ (к.)	-908,2	42,7	-854,2
$\text{CO}$ (г.)	-110,5	197,5	-137,1	$\text{N}_2$	0	-84,4	0
$\text{CO}_2$ (г.)	-393,5	213,7	-394,4	$\text{O}_2$	0	205,04	0
$\text{CaCO}_3$ (к.)	-1207,0	88,7	-1127,7	$\text{Cl}_2$	0	222,0	0
$\text{CaC}_2$ (к.)	-62,8	70,3	-67,8	C(графіт)	0	5,74	0
$\text{CaO}$ (к.)	-635,5	39,7	-604,2	Fe	0	27,15	0
$\text{Ca}(\text{OH})_2$ (к.)	-986,6	76,1	-896,8	Al	0	28,35	0
$\text{CaC}_1_2$ (к.)	-785,8	113,8	-750,2	$\text{Al}^{3+}$	-524,7	-313,4	-481,2
$\text{CuO}$ (к.)	-162,0	42,6	29,9	$\text{CO}_3^{2-}$	-676,3	-53,1	-528,1
$\text{CuS}$ (к.)	-53,1	66,5	-53,6	$\text{Ca}^{2+}$	-542,9	-55,2	-553,1
$\text{FeO}$ (к.)	-264,8	60,8	-244,3	$\text{Cl}^-$	-167,46	55,1	-131,2
$\text{Fe}_2\text{O}_3$ (к.)	-322,2	87,4	-740,3	$\text{Cu}^{2+}$	64,4	-98,7	64,98
$\text{Fe}_3\text{O}_4$ (к.)	-1117,1	146,2	-1014,2	$\text{Fe}^{2+}$	-87,9	-113,4	-84,94
$\text{FeS}$ (к.)	-100,4	60,29	-100,8	$\text{Fe}^{3+}$	-47,7	-293,3	-10,5
$\text{HCl}$ (г.)	-92,3	186,8	-95,2	$\text{H}^+$	0	0	0
$\text{H}_2\text{O}$ (г, п.)	-241,8	188,7	-228,6	$\text{NH}_4^+$	-132,4	114,4	-79,5
$\text{H}_2\text{O}$ (р)	-285,8	70,1	-237,3	$\text{K}^+$	-251,2	102,5	-282,3
$\text{H}_2\text{S}$ (г.)	-21,0	205,7	-33,8	$\text{Li}^+$	-278,4	14,2	-293,8
$\text{NH}_3$ (г.)	-46,2	192,6	-16,7	$\text{NO}_2^-$	-106,3	125,1	-35,3
$\text{NH}_4\text{NO}$ (к.)	-365,4	151,0	-183,8	$\text{NO}_3^-$	-206,6	146,4	-110,5
$\text{NH}_4\text{Cl}$ (к)	-314,2	95,8	-203,2	$\text{Na}^+$	-239,66	60,2	-261,87
$\text{N}_2\text{O}$ (г.)	82,0	219,9	104,1	$\text{OH}^-$	-229,94	-10,54	-157,3
$\text{NO}$ (г.)	90,3	210,6	86,6	$\text{SO}_4^{2-}$	-907,5	17,2	-743,0
$\text{NO}_2$ (г.)	33,5	240,2	51,5	$\text{Zn}^{2+}$	-153,74	-110,67	-127,3

**Додаток 5 – Добуток розчинності малорозчинних електролітів**

<i>Електроліт</i>	<i>ДР</i>	<i>Електроліт</i>	<i>ДР</i>
$AgBr$	$5,3 \cdot 10^{-13}$	$CuS$	$6 \cdot 10^{-36}$
$AgCl$	$1,8 \cdot 10^{-10}$	$Fe(OH)_2$	$1 \cdot 10^{-15}$
$AgI$	$1,1 \cdot 10^{-16}$	$Fe(OH)_3$	$3,7 \cdot 10^{-40}$
$Ag_2S$	$6 \cdot 10^{-50}$	$FePO_4$	$1,3 \cdot 10^{-22}$
$Ag_2SO_4$	$2 \cdot 10^{-5}$	$FeS$	$5 \cdot 10^{-18}$
$BaCO_3$	$5,1 \cdot 10^{-9}$	$HgS$	$1,6 \cdot 10^{-52}$
$BaCrO_4$	$1,6 \cdot 10^{-10}$	$MgCO_3$	$2,1 \cdot 10^{-5}$
$BaSO_4$	$1,1 \cdot 10^{-10}$	$Mg(OH)_2$	$1,3 \cdot 10^{-11}$
$Ba_3(PO_4)_2$	$6 \cdot 10^{-39}$	$Mg_3(PO_4)_2$	$1,0 \cdot 10^{-13}$
$CaCO_3$	$5,1 \cdot 10^{-9}$	$MnCO_3$	$5,0 \cdot 10^{-10}$
$CaC_2O_4$	$2 \cdot 10^{-9}$	$MnS$	$2,5 \cdot 10^{-10}$
$CaF_2$	$4 \cdot 10^{-11}$	$PbCO_3$	$7,5 \cdot 10^{-14}$
$CaSO_4$	$6,3 \cdot 10^{-5}$	$PbI_2$	$8,0 \cdot 10^{-9}$
$Ca_3(PO_4)_2$	$2 \cdot 10^{-29}$	$PbS$	$2,5 \cdot 10^{-27}$
$CaHPO_4$	$2,7 \cdot 10^{-7}$	$PbSO_4$	$1,6 \cdot 10^{-8}$
$Ca_5(OH)(PO_4)_3$	$1,6 \cdot 10^{-58}$	$SrCO_3$	$1,1 \cdot 10^{-10}$
$CdS$	$7,9 \cdot 10^{-27}$	$Zn(OH)_2$	$1 \cdot 10^{-17}$
$Cu(OH)_2$	$2,2 \cdot 10^{-20}$	$ZnS$	$1,6 \cdot 10^{-24}$

**Додаток 6 – Коефіцієнти активності йонів при різних йонних силах розчину**

<i>Йонна сила розчину</i>	<i>Заряд йона z</i>		
	$\pm 1$	$\pm 2$	$\pm 3$
0,001	0,98	0,78	0,73
0,005	0,95	0,66	0,51
0,01	0,92	0,60	0,39
0,05	0,84	0,50	0,21
0,1	0,81	0,44	0,16
0,2	0,80	0,41	0,14
0,3	0,81	0,42	0,14
0,4	0,82	0,45	0,17
0,5	0,84	0,50	0,21

**Додаток 7 – Значення деяких фундаментальних фізичних сталих**

<i>Стала</i>	<i>Позначення</i>	<i>Чисельні значення</i>
Швидкість світла у вакуумі	c	$2,9979246 \text{ м/с}$
Стала Планка	h	$6,62618 \cdot 10^{-34} \text{ Дж}\cdot\text{s}$
Елементарний електрич. заряд	e	$1,602189 \cdot 10^{-19} \text{ Кл}$
Стала Авогадро	N	$6,022045 \cdot 10^{23} \text{ моль}^{-1}$
Стала Фарадея	F	$9,64846 \cdot 10^4 \text{ Кл/моль}$
Газова стала	R	$8,3144 \text{ Дж}/(\text{моль}\cdot\text{К})$

Додаток 8

**ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ЕЛЕМЕНТІВ Д.І. МЕНДЕЛЕЄВА**

ПЕРІОД	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	H Гідроген Водень 1,0079	Be Берилій 6,941	B Бор 9,0122	C Карбон Вуглець 10,811	N Нітроген Азот 12,011	O Оксиген Кисень 14,007	F Фтор Флуор 15,999	He Неон 20,179
2	Li Літій 7 6,941	Mg Магній 24,305	Al Алюміній 26,982	Si Сіліций 28,086	P Фосфор 30,974	S Сульфур Сірка 32,066	Cl Хлор 35,453	Ne Неон 20,179
3	Na Натрій 22,990	K Калій 39,098	Ca 40,078	Sc Скандій 44,956	Ti Титан 47,88	V Ванадій 50,942	Cr Хром 51,996	Ar Аргон 39,948
4	K Калій 39,098	Cu 63,546	Zn Купрум Мідь 65,39	Ga Цинк Галій 69,723	Ge Германій Арсен 72,59	As Ас 74,922	Se Селен 78,904	Mn Манган Манган 54,938
5	Rb Рубідій 85,468	Sr Стронцій 87,62	Y Ітрій 88,906	Zr Ітрум Ітрум 91,224	Nb Ніобій 92,906	Mo Молібден 95,94	Tc Технецій [59]	Kr Криптон 79,904
6	Ag Аргентум Срібло 107,87	Cd Кадмій 112,41	In Індій 114,82	Sn Станум Олово, лінна 118,71	Te Стибій 121,75	Re Іод 127,60	Os Ксенон 126,90	Pd Паладій 106,42
7	Cs Цезій 132,91	Ba Барій 137,33	*La Лантан 138,91	Hf Гафній 178,49	Ta Тантал 180,95	W Вольфрам 183,85	Rn Реній 186,21	Pt Платина 195,08
8	Au Аутрум Золото 196,97	Hg Меркурій Ртуть 200,59	Tl Талій 204,38	Pb Пломбум Синінсь, оліво 207,2	Bi Вісмут 208,98	Po Полоній 209	At Астат 210	Ru Родон 192,22
9	Fr Францій 87	Ra Радій 226,03	**Ac Актиній [227]	Db Дубній [262]	Jl Джолюїт [263]	Rf Резервдій [262]	Bh Борій [265]	Hn Ганій [265]
10	Ce Церій 140,912	Pr Празеодійм 144,24	Nd Недім [147]	Pm Прометій 150,36	Sm Самарій 151,96	Eu Европій 158,93	Gd Гадолій 157,25	Tb Тербій 162,50
11	Th Торій [231]	Pa Протактній 238,93	U Уран [237]	Np Нептуний [244]	Pu Плутоній [243]	Am Амерітій [243]	Cm Корій [247]	Bk Берклій [247]
12	Lu Люренсій [260]	Er Ербій 168,93	Dy Диспрозіт 167,26	No Нобелій [259]	Es Етанітій [252]	Md Фермій [257]	Mt Майдлевій [268]	Yb Ітербій 174,97

## Додаток 9

### Розчинність солей та основ у воді

	Катіони																					
	K <sup>+</sup>	Na <sup>+</sup>	NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	Ba <sup>2+</sup>	Sr <sup>2+</sup>	Ca <sup>2+</sup>	Mg <sup>2+</sup>	Al <sup>3+</sup>	Cr <sup>3+</sup>	Fe <sup>3+</sup>	Fe <sup>2+</sup>	Mn <sup>2+</sup>	Zn <sup>2+</sup>	Ni <sup>2+</sup>	C <sub>0</sub> <sup>2+</sup>	Ag <sup>+</sup>	Hg <sup>2+</sup>	Cu <sup>2+</sup>	Cd <sup>2+</sup>	Pb <sup>2+</sup>	Bi <sup>3+</sup>	Sn <sup>2+</sup>
OH <sup>-</sup>	P	P	P	P	BP	P	H	H	H	H	H	BP	H	H	H	H	H	H	H	H	H	
F <sup>-</sup>	P	P	P	BP	P	P	P	-	BP	BP	H	H	H	P								
Cl <sup>-</sup>	P	P	P	P	P	P	BP	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	BP	-	P	
Br <sup>-</sup>	P	P	P	P	P	P	BP	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	BP	-	P	
I <sup>-</sup>	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	H	H	P	BP	H	P	
S <sup>2-</sup>	P	P	P	P	P	P	BP	-	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	
SO <sub>3</sub> <sup>2-</sup>	P	P	H	H	BP	-	-	H	H	H	H	H	H	H	H	-	H	H	H	-	-	
SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	P	P	H	BP	BP	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	BP	P	P	P	
PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup>	P	P	H	H	H	BP	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	-	
CrO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	P	P	H	BP	P	-	-	-	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	
CO <sub>3</sub> <sup>2-</sup>	P	P	H	H	H	-	-	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	-	
NO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	-	
NO <sub>2</sub> <sup>-</sup>	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	H	
CH <sub>3</sub> COO <sup>-</sup>	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	-	
SiO <sub>3</sub> <sup>2-</sup>	P	P	-	H	H	H	H	-	H	H	H	-	-	-	-	H	H	H	H	-	-	

**Примітка:** P – розчинні у воді; BP – важкорозчинні (малорозчинні); H – практично нерозчинні; “–“ риска означає, що речовина не існує або розкладається водою.

*Навчально-методичне видання*

## **МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ**

### **ДО СРС ТА ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ХІМІЯ З ОСНОВАМИ БІОГЕОХІМІЇ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІІІ КУРСУ ЗАОЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ**

Напрям підготовки –6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

*Спеціалізація – агроекологія  
(інтегрований план підготовки)*

Укладачі: Горліченко М.Г., доц., к.п.н., Шевченко С.В., ст. викл.

Підп. до друку \_\_\_\_\_ Формат \_\_\_\_\_ Папір \_\_\_\_\_  
Умовн. друк. арк. \_\_\_\_\_ Тираж \_\_\_\_\_ Зам. № \_\_\_\_\_

Надруковано з готового оригінал-макета

---

Одеський державний екологічний університет,  
65016, м. Одеса, вул. Львівська, 15