



ЗМІСТ

РОЗДІЛ I. БОТАНІКА

Войтюк Василь, Андрєєва Валентина, Кичиліук Олександр, Гетьманчук Анатолій

Лісівничо-селекційна оцінка насаджень сосни звичайної Національного природного парку
«Прип'ять-Стохід»5

Вінічук Михайло

Арбускулярні мікоризні гриби та їх вплив на перехід радіоцезію з ґрунту у рослини..... 11

Гуцман Марія, Гуцман Сергій

Систематична структура адвентивної фракції флори Волинської височини..... 17

Качинська Вікторія

Еколого-географічні особливості ліхенобіоти гірничо-металургійного комплексу Кривбасу22

Коваленко Ігор

Різноманіття еколого-ценотичних стратегій видів рослин трав'яно-чагарничкового ярусу
в лісових екосистемах на північному сході України.....26

Кузярін О., Кузьмішина І., Коцун Л.

Болотна рослинність Шацького Поозер'я29

Машевська Алла, Єрмейчук Тамара

Біологічні основи розмноження самшиту вічнозеленого *Buxus Sempervirens* L. В
умовах закритого ґрунту33

Савоськіна Анна

Історичні особливості та сучасна категоріальна структура мережі штучних заповідних парків
Українського Полісся38

Скляр Вікторія

Характеристика новоствореного парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва «Будинок-музей А. П. Чехова» в м. Суми	43
--	----

Ткачук Олеся

Вплив паклобутразолу на анатомо-морфологічні показники рослин картоплі.....	47
---	----

РОЗДІЛ II. ЗООЛОГІЯ**Зимарова Анастасія**

Видовий склад та особливості просторового розподілу воронових птахів (<i>Corvidae</i>) у місті Житомирі.....	52
--	----

Іванців Володимир, Бусленко Леся, Сидорчук Петро

Комплекси дощових черв'яків агробіоценозів Кременецького краю	58
---	----

Матвійчук Олександр

Ретроспективна оцінка орнітофауни Подільського Побужжя.....	63
---	----

Омельковець Ярослав, Шваєвська Катерина, Мельник Катерина

Порівняльне дослідження деяких гематологічних показників птахів різних екологічних груп	67
---	----

Теплюк Вадим, Кубат Наталія

Біоекологічний аналіз метеликів родин Papilionidae, Pieridae і Nymphalidae міста Буськ та його околиць	73
--	----

Павел Шекк

Изменение видового состава ихтиофауны Хаджибейского лимана под действием антропогенных факторов и пути её целенаправленного формирования.....	78
---	----

Бусленко Леся, Щенна Леся

Структура комплексу дощових черв'яків родини Lumbricidae сірих лісових ґрунтів Волинської височини	84
--	----

РОЗДІЛ III. ЕКОЛОГІЯ**Гулай Олександр**

Дія секретів шкірних залоз <i>Abramis brama</i> на бактерії <i>Erysipelothrix rhusiopathiae</i>	90
---	----

Гусаковська Т.

Екологічний розподіл водних твердокрилих у біотопах Рівненської області.....	94
--	----

Жданюк Б., Андрейчук Ю., Ковальчук І.

Геоінформаційне картування геоекологічного стану Мізоцького краю	98
--	----

Кравченко О., Максим В.

Оцінка чутливості <i>Daphnia magna</i> до дії наноаквацитратів цинку <i>in vivo</i>	110
---	-----

Стернік В., Марциновський В., Мельник В.

Вміст ферменту каталази в ґрунті на території АЗС м. Рівне	115
--	-----

РОЗДІЛ IV. ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ І ТВАРИН

Апончук Людмила	
Особливості периферичного кровотоку в жінок-курців	121
Атамнах С., Решетник Є., Левадяньська Ю., Барановський В., Весельський С., Янчук П.	
Вплив серотоніну на кон'югацію та гідроксилювання жовчних кислот у печінці щурів.....	126
Коцан Ігор, Качинська Тетяна, Берлач Світлана	
Особливості варіабельності серцевого ритму у дівчат підліткового періоду з різним рівнем вегетативної регуляції.....	129
Бондаренко (Рассомагіна) М., Кравченко, Макачук М.	
Когерентні зв'язки основних ритмів В. ЕЕГ головного мозку правшів та лівшів при монокулярному сприйнятті доміантним чи недоміантним оком вербальної емоційної інформації.....	135
Виноградова О., Янчук П., Пасічніченко О.	
Роль лейкотриєнів у реалізації скоротливої тонічної активності ворітної вени під впливом ацетилхоліну в умовах норми та експериментальної портальної гіпертензії	141
Волошин Олена, Чень Ірина, Волошин Володимир	
Характер психо-моторних реакцій в осіб з різним рівнем фізичної працездатності	144
Грабовська С.	
Вплив введення низьких доз хлорпірифосу до та під час вагітності на постнатальний розвиток другого покоління щурів	149
Єна Марина, Кузнєцова Галина, Рибальченко Володимир	
Морфо-функціональний стан ободової кишки щурів за умов дії похідних піролу на тлі експериментального коліту.....	153
Єфіменко Олена, Савченко Юлія, Фалалєєва Тетяна, Берегова Тетяна, Співак Микола	
Порівняльна дія сучасних прокінетиків та нанокристалічного діоксиду церію на моторну функцію травного тракту у щурів різного віку.....	158
Качинська Тетяна, Абрамчук Ольга, Кузнєцов Ілля	
Особливості джерел викликаної активності кори головного мозку в лівшів та правшів під час класифікації стимулів пов'язаних із локалізацією та формою об'єкта	160
Коровіна Л.	
Стан вегетативної нервової системи у студентів молодших курсів	171
Маркевич А., Вірченко О., Фалалєєва Т., Кудрявцев К., Остапченко Л.	
Профіль сироваткових цитокінів у щурів з експериментальним виразкоутворенням на тлі лікувального введення пролінвмісної сполуки	175
Melnychuk Olexiy, Motuziuk Olexandr, Shvayko Svitlana, Zay Svitlana	
Progressive fatigue dynamic development of isolated natively <i>musculus gastrocnemius medialis</i> in alcoholic rats	181
Михалевич Ольга	
Особливості успадкування спектральних характеристик фонові ЕЕГ у моно- та дизиготних близнят	186
Петруша Юлія	

Дослідження антидепресивної активності динатрієвої солі 2-(піридин-4-ілтїо)бурштинової кислоти	191
Редька Ірина	
Вплив зорових дисфункцій на вікові зміни складності нейродинаміки головного мозку.....	195
Романюк Альона	
Аналіз латентності P300 у спортсменів ігрових видів спорту та легкоатлетів	201
Руднік Наталія, Шевчук Тетяна, Поручинська Тетяна	
Роль цитогенетичної діагностики у виявленні хромосомної патології та поліморфізмів хромосом у постнатальному періоді розвитку у Волинській області.....	205
Слободяник Л., Янчук П., Решетнік Є.	
Вплив сірководню на кровообіг в печінці щурів при портальній гіпертензії.....	213
Станішевська Тетяна	
Закономірності тиреоїдної модуляції фізіологічних ефектів адреналіну	219
Трофим'як Юрій, Швайко Світлана, Дмитроца Олена	
Порівняльна характеристика показників фізичного розвитку школярів міської та аграрної зон.....	223
Цирюк Олена, Берегова Тетяна	
Чутливість парієтальних клітин до стимуляторів шлункової секреції після тривалого введення омепразолу.....	230
Швайко Світлана, Дмитроца Олена, Журавльов Олександр	
Вплив хронотипу на сприйняття часових проміжків обстежуваних осіб у різний період доби.....	236
Шишкевич Вікторія, Гайдай Микола	
Особливості реагування серцево-судинної системи на ортостатичну пробу у гімнастів різної спортивної кваліфікації	240
Наші автори	246

Tepliuk Vadim, Kubat Natali. Bioecological analysis of Papilionidae, Pieridae and Nymphalidae butterflies families of the town Busk and its outskirts. The purpose of the work was to specify the species composition, to determine the relative abundance, to conduct a comprehensive bioecological analysis of day butterflies. The main natural habitats (forests, meadows) and agrocenoses were explored. 31 species butterflies were registered and they were divided into the groups depending on the relative abundance. Biotopical affiliation, trophic relations of caterpillars, flying period of adults, peculiarities of wintering and development of individual species were established. In meadows 24 species were registered and in the forests and agrocenoses there were 20 species in each. *P. brassicae*, *P. rapae*, *P. napi*, *P. daplidice* were marked as pests of agricultural crops in the caterpillar stage. The most of species (13) overwinters in larvae stage. The flying of butterflies begins from the middle of March and lasts until the middle of October. 17 species have one generation a year, 12 species have two, 2 species have more than two.

Key words: butterflies, caterpillars, habitat, forests, grasslands, agrocenoses.

Стаття надійшла до
редколегії
19.01.2015 р.

УДК 693.3

Павел Шекк

Изменение видового состава ихтиофауны Хаджибейского лимана под действием антропогенных факторов и пути её целенаправленного формирования

Хаджибейський лиман – високопродуктивна водойма північно-західного Причорномор'я. Під впливом антропогенних чинників зміни гідролого-гідрохімічного режиму послідовно перетворювали лиман із полігалінного в мезогалінний – олігогалінний – прісноводний і знов в олігогалінний. За останні роки в лимані траплялося до 21 виду риб. Багато з них (калкан, вугор, осетер, сом, глоса та ін.) потрапили в лиман випадково або в результаті обмеженої інтродукції. Водночас виживання, зростання і зимівля у лимані цих об'єктів дає змогу зробити висновок про відповідність умов водойми їх еколого-біологічним потребам.

Сьогодні лиман являє собою солонуватоводну водойму-накопичувач, що уможливило цілеспрямоване формування видового складу іхтіофауни і розширення її видового різноманіття за рахунок інтродукції цінних видів солонуватоводних і прохідних риб.

Ключові слова: Хаджибейський лиман, гідролого-гідрохімічний режим, видовий склад іхтіофауни, цілеспрямоване формування

Постановка научной проблемы и её значение. Лиманы и лагуны Причерноморья – высокопродуктивные естественные экосистемы. Благоприятный гидролого-гидрохимический режим, высокая температура воды, мелководность в сочетании с присутствием в составе флоры и фауны пресноводных, солоноватоводных и морских форм определяют биологическое разнообразие и высокую рыбопродуктивность этих водоемов[1–4].

Один из наиболее продуктивных водоемов северо-западного Причерноморья – Хаджибейский лиман. На пути своего исторического развития водоём пережил ряд периодов, последовательно превращаясь из полигалинного в мезогалинный – олигогалинный – пресноводный и вновь в олигогалинный водоем [1; 2; 5; 6]. Изменение солёности сопровождалось коренным изменением видового состава биоты лимана. Морскую ихтиофауну сменила солоноватоводная, а затем пресноводная [1–4; 7].

Сброс пресных вод с очистных сооружений г. Одессы в 60-х годах прошлого столетия привел к опреснению лимана, и с этого момента его гидролого-гидрохимический режим полностью зависит от объема сброса [1–4].

Для оценки современного состояния ихтиоценозов Хаджибейского лимана и прогноза дальнейших изменений, в составе ихтиофауны необходим мониторинг экосистемы водоёма, что позволит спрогнозировать возможные изменения в составе ихтиофауны и даст возможность целенаправленного формирования её состава.

Цель исследования – анализ факторов, влияющих на биоразнообразие ихтиофауны водоема, характеристика её современного видового состава и перспектив её целенаправленного формирования.

Материал и методика Сбор ихтиологического материала проводили на протяжении 1980–2014 гг. в разные сезоны года на всей акватории лимана. В период промысла материал отбирали из промысловых орудий лова (сети, волокуши, тралы). В запретный период – из контрольных орудий лова. Весь улов сортировали по видам. Фиксировали общую величину улова и соотношение в нем различных видов. Выборку, по 25–50 особей каждого вида, подвергали полному биологическому анализу [8]. Фиксировали соотношение отдельных видов в улове, распределение их по акватории лимана. Отбирали пробы для изучения питания рыб, определения возрастной структуры популяции. Весь полученный материал доставляли в лабораторию, где и проходила его обработка.

Видовой состав определяли при помощи определителей пресноводной и морской ихтиофауны [9; 10; 11]. В работе также использованы многолетние отчетные данные Одесского отделения ЮгНИРО и ихтиологической службы «Одессарыбвод», сообщения отдельных рыбаков и инспекторов службы государственной рыбоохраны о случаях достоверного вылова в акватории лимана редких видов рыб. При этом часто мы получали замороженный или зафиксированный материал, либо фотографии тех или иных объектов. Достоверность таких сообщений всегда тщательно проверялась.

Результаты исследования. Хаджибейский лиман расположен вблизи г. Одессы в долине реки Малый Куяльник. Это водоем закрытого типа, отделен от моря песчаной пересыпью шириной 4–5 км. Длина лимана – 40 км, ширина – от 0,8 до 3,5 км. Северная часть лимана более мелководная, южная – глубоководная. Максимальная глубина достигает 20–24 м, средняя – 4 м. В северо-западной части лимана расположен Палиевский залив, площадью 1000–1500 га, с глубинами до 5 м. В вершину залива впадает река Свиная [1–7].

Несмотря на сброс больших объемов очищенных сточных вод, лиман является «слабозагрязненным» (умеренно загрязненным), а концентрация токсичных веществ в тканях и органах гидробионтов ниже ПДК [4;5].

Во второй половине XIX века ихтиофауна лимана была представлена морскими видами рыб (бычки и глосса), которые исчезли после полной изоляции от моря и осолонения водоема до 35 ‰.

В 30-х годах прошлого века после снижения солености до 16,7 ‰ в лиман вселили креветку, глоссу и кефаль. С 1941 по 1944 г. в результате взрыва дамбы лиман соединился с морем, из которого в водоём зашли атерина, бычки, глосса, кефали и другие виды морских рыб [2–4; 7]. В послевоенные годы в лимане обитала камбала глосса, бычки: песочник и зеленчак. Дополнительно в водоём вселяют бычков: кнута и кругляка. Последующая изоляция водоема от моря сопровождалась осолонением лимана [1; 2, 12]. В результате в лимане остаётся только три вида бычков и камбала глосса, которые и служили объектами промысла вплоть до 1970-х гг. Кроме бычков, в лимане в большом количестве добывали мидию и креветку.

Ещё в 50-е годы неоднократно предпринимались попытки интродукции в лиман сеголеток кефали (лобана, сингиля и остроноса) и камбалы калкана [13], однако эти попытки не увенчались успехом, хотя интродуценты выживали в водоёме и быстро росли.

Увеличение объемов сброса сточных вод привело к повышению уровня, опреснению и эвтрофикации водоёма [1–7]. В результате уже к 1975 г. полностью исчезли глосса, бычки (зеленчак и нигер), мидия, снизилась численность и уменьшились размеры креветки.

К началу 80-х годов соленость вод лимана снизилась до 8–11 ‰. В составе ихтиофауны появились карась, плотва, укля, окунь, проникшие из прудов, расположенных в долине реки Малый Куяльник. Вместо обедневшего морского ихтиокомплекса активно формируется пресноводный.

В 1980 г. лиман впервые зарыбляют серебряным карасём (2 млн. экз.), вместе с которым из Днестровского лимана и придунайских озерах завозят мальков леща, щуки, сома, густеры и других пресноводных рыб, а также раков.

В 1988 г. в лимане в садках успешно выращивают кефаль лобана и остроноса и сингиля [14], что показало возможность обогащения ихтиофауны водоёма за счет интродукции эвригалинных видов рыб.

Росту численности пресноводных рыб способствуют естественные нерестилища, расположенные в верховьях лимана (с. Белка) и Палиёвского залива (с. Егоровка), где ежегодно проходил массовый нерест карпа, карася, плотвы, щуки, судака, окуня и др.

В 1985 г. Палиёвский залив разделяют дамбами на три части. В средней части строится рыбо-разводный участок «Одесрыбхоза», где выращивают карпа, карася, белого и пестрого толстолобика, судака и окуня. Встречаются здесь также бычки: песочник, кругляк, зеленчак и тарань.

Дальнейшее зарегулирование Палиёвского залива дамбами и строительства пруда в его вершине приводит к обмелению и заилению, а отсутствие пресноводного стока – к прогрессирующему осолонению и потере нерестилищ. Уже в 90-х годы. ихтиофауна вершины залива представлена только немногочисленным бычком – песочником, тугорослым карасем, трёхиглой колюшкой и мраморным бычком-лысуном. В то же время уловы в пределах рыбоводного участка «Одесрыбхоза» продолжают расти и в середине 90-х годов достигают максимума – 610–650 т (больше 1 т/га). Выращивание рыб здесь проводили при дополнительном кормлении. Ежегодно использовалось 20–40 тыс. тонн комбикорма, который высыпали на дно водоема (на кормовые площадки). Это приводит к прогрессирующей эвтрофикации. На дне залива образуется сероводородный слой. Ухудшению экологической ситуации способствуют периодические сбросы с навозохранилища Отрадовской птицефабрики.

Уже к 1990–1991 гг. наметилась стойкая тенденция к деградации центральной части залива. В 1992 г. в акватории рыбучастка снижаются уловы, замедляется рост рыб. В результате повышения солености и щелочности вод наблюдается массовое поражение карпа и растительноядных рыб краснухоподобным заболеванием.

В результате плохого водообмена с открытой акваторией лимана и отсутствием притока пресной воды происходит осолонение и пересыхание вершины и средней части Палиевской залива.

Соленость вод залива достигает 10–16 ‰ и продолжает расти. Предпринимаются попытки интродукции в эту акваторию русского осетра, бычков – зеленчака и кругляка, а с 1992 г., в соответствии с нашими рекомендациями, – кефали пиленгаса, камбалы глоссы и камбалы калкана. Интродуценты хорошо прижились в акватории залива, успешно зимовали и хорошо росли.

Практически полное отсутствие естественного воспроизводства пресноводной ихтиофауны и сокращение, а потом и полное прекращение зарыбления карпом, растительноядными рыбами и карасем приводит к падению запасов и промышленных уловов в Хаджибейском лимане, которые достигают в 1995 г. минимума – 75 т.

Акклиматизации – в 1992 г. в Палиевском заливе, а затем и в открытой акватории Хаджибейского лимана – пиленгаса [15] способствует строительство на базе Палиёвского рыбучастка комплекса по воспроизводству морских рыб. Начиная с 1993 г., лиман ежегодно зарыбляется миллионами сеголеток и годовиков пиленгаса, полученных на этом рыбопитомнике [15; 16]. Уже к 2004 г. пиленгас натурализуется в лимане и формирует здесь самовоспроизводящуюся популяцию. Высокая численность и биомасса пиленгаса (а уже к 2000 г. этот вид занимает ведущее место в уловах) стимулирует рост численности судака, для которого мальки пиленгаса становятся основным объектом питания. При этом ослабевший пресс хищника на популяцию карася и бычков приводит так же к росту их численности в лимане [16].

Таким образом, Хаджибейский лиман в результате хозяйственной деятельности человека преобразован в водоем-накопитель. Формирование его экосистемы зависит преимущественно от гидролого-гидрохимического и уровневого режима, которые поддерживаются искусственно. За последние 34 года (табл. 1) в лимане встречалось до 21 вида рыб. Многие из них (калкан, угорь, осетр, густера, сом, глосса и др.) попали в лиман случайно либо в результате ограниченной интродукции и встречались редко,

иногда единично. Вместе с тем выживание, рост и зимовка в лимане этих объектов позволяет сделать вывод о соответствии условий обитания в водоёме их эколого-биологическим потребностям.

В последние годы (2013–2014 гг.) после повышения солёности в заливе до 18–19 ‰ здесь восстановилась популяция креветки. Изменившиеся условия обеспечили интенсивное воспроизводство, высокую численность и быстрый рост травяного шримса. За один сезон креветка достигает 4,5–7,0 см, а общий улов в заливе по экспертным оценкам составляет 3–6 т.

Необходимо отметить, что ихтиофауна водоема и его рыбопродуктивность в значительной степени формируется в результате интродукции различных видов рыб. Сегодня Хаджибейский лиман – солоноватоводный водоем, в равной степени пригодный для нагула некоторых пресноводных и солоноватоводных видов гидробионтов, что открывает путь к целенаправленному формированию ихтиофауны, обогащению её ценными промысловыми объектами.

Таблица 1

Видовой состав и распределение ихтиофауны в акватории Хаджибейского лимана

Виды	Палийский залив		Хаджибейский лиман					
			Верхняя часть		Средняя часть		Нижняя часть	
	1980–1995	2000–2014	1980–1995	2000–2014	1980–1995	2000–2014	1980–1995	2000–2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Карп <i>Caprinus carpio L.</i>	+	–	++	+	+	+	++	++
Толстолобик белый <i>Hypophthalmichthys molitrix Val.</i>	+	–	++	++	+	++	++	++
Толстолобик пестрый <i>Aristichthys nobilis Rich</i>	+	–	+	++	+	++	++	++
Белый амур <i>Ctenopharingodon idella Val</i>	+	–	+	+	+	+	++	+
Судак <i>Lucioperca lucioperca L.</i>	++	+	++	++	++	++	++	++
Сом европейский <i>Silurus glanis L</i>	–	–	+	–	–	–	–	–
Окунь <i>Perca fluviatilis L</i>	++	+	+	+	+	+	+	+
Лещ <i>Abramis brama L.</i>	–	–	++	–	+	–	–	–
Карась серебряный <i>Carassius auratus Bloch</i>	++	–	++	++	++	++	++	++
Густера <i>Blicca bjoerkna L.</i>	–	–	+	–	–	–	–	–
Тарань <i>Rutilus rutilus hesheli Schlegel</i>	+	–	+	–	–	–	+	–
Осетер русский <i>Acipenser guldenstadti Brandt</i>	+	–	–	–	–	–	–	–
Бычок-травяник <i>Gobius ophiocephalus Pallas.</i>	++	–	++	–	++	–	–	–
Бычок-песочник <i>Neogobius fluviatilis Pallas.</i>	++	+	++	++	++	++	++	++
Бычок-кругляк <i>Neogobius melanostomus Pall.</i>	++	–	+	++	++	+	+	+

Мраморный бычок-лысун <i>Pomatoschistus marmoratus</i> Risso	++	+	++	++	++	++	++	++
Кефаль пиленгас <i>Liza heamatocheilus</i> Temminck et <i>Schlegel</i>	++	++	++	++	++	++	++	++
Трехиглая колюшка <i>Gasterosteus aculeatus</i>	++	+	++	++	++	++	++	++
Камбала калкан <i>Psetta maeotica</i> Pall	+	–	–	–	–	–	–	–
Камбала-глоса <i>Platichthys flesus luscus</i> <i>Pall</i>	+	–	–	–	–	–	–	–
Угорь европейский <i>Anguilla fnguilla</i>	–	–	–	–	–	–	–	+
Всего видов	17	6	16	12	14	12	13	13

Встречаются редко +

Многочисленные ++

Представляется целесообразной реакклиматизация в водоеме камбалы глоссы, продуктивности которой можно значительно увеличить за счет использования организмов зообентоса, креветки и мелких форм бычков.

Перспективными объектами культивирования в Хаджибейском лимане могут служить осетровые, представленные русским и ленским осетрами, а так же бестером.

Для повышения рыбопродуктивности водоема за счет бентофагов безусловно перспективна интродукция в лиман бычков: кругляка, кнута, нигера, бобыря и зеленчака.

Рациональное использование Палиевского залива – важная составляющая в формировании биоразнообразия ихтиофауны и высокой рыбопродуктивности лимана. При этом первоочередная задача состоит в возобновлении свободного водообмена между заливом и открытой акваторией лимана. Улучшение гидролого-гидрохимического режима этой акватории позволит использовать ее как естественное нерестилище пиленгаса, глоссы, бычков и креветки.

Другим не менее привлекательным направлением развития аквакультуры в Палиевском заливе может служить выращивание калкана. Как показали исследования, проведенные в предыдущие годы, при нормализации водообмена и солености в пределах 8–14 ‰ этот объект перспективен для культивирования.

Значительный интерес представляет возможность интродукции в Хаджибейский лиман лососевых рыб – стальноголового лосося и радужной форели. Благодаря высокой экологической пластичности эти виды отлично выживали в Шаболатском и Тилигульском лиманах и показали высокую потенцию роста в этих водоёмах. Поэтому интродукция их в Хаджибейский лиман, на наш взгляд, весьма перспективна.

Важное направление, которое следует развивать в акватории Хаджибейского лимана – искусственные рифы. Формирование биоты этих инженерных сооружений позволит не только значительно увеличить численность и продукцию некоторых видов рыб, например бычковых, но и улучшит экологическое состояние водоёма. Формирование на субстрате искусственных рифов колоний двухстворчатых моллюсков (мидии, мителастера и других гидробионтов) позволит значительно улучшить очистку вод лимана, повысит общую кормность водоема.

Выводы.

1. В разные годы изменение гидрологического режима и солёности вод Хаджибейского лимана сопровождалось коренной перестройкой видового состава биоты водоёма.

2. В настоящее время в результате хозяйственной деятельности человека лиман преобразован в солоноватоводный водоем-накопитель, формирование экосистемы которого в основном зависит от гидролого-гидрохимического и уровня режима, которые регулируются искусственно.

3. За последние 34 года в лимане встречалось до 21 вида рыб, многие из которых (калкан, угорь, осетр, густера, сом, глосса и др.) попали сюда случайно либо в результате ограниченной интродукции и встречались редко, иногда единично

4. Лиман – солоноватоводный водоем, в равной степени пригодный для нагула как пресноводных, так и солоноватоводных видов гидробионтов, что открывает путь к целенаправленному формированию ихтиофауны, обогащению её ценными промысловыми объектами.

5. Перспективными объектами интродукции в Хаджибейский лиман могут служить: камбаловые, бычковые, осетровые и лососевые рыбы, а также креветка.

6. Повышению биологической продуктивности и активизации процессов самоочистки будет способствовать строительство в акватории лимана искусственных рифов.

Источники и литература

1. Розенгурт М. Ш. Гидрология и перспективы реконструкции природных ресурсов одесских лиманов / М. Ш. Розенгурт. – К. : Наукова думка. 1974. – 221 с.
2. Лиманно-устевые комплексы Причерноморья. Географические основы хозяйственного освоения / под ред. Г. И. Швобса. – Л. : Наука, 1988. – 330 с.
3. Старушенко Л. И. Причерноморские лиманы одесщины и их рыбохозяйственное использование / С. Г. Бушуев. – Одесса : Астропринт, 2001. – 151 с.
4. Северо-западная часть Черного моря: биология и экология. – К. : Наук. думка. 2006. – 701 с.
5. Журавлева Л. А. Режим минерального фосфора в воде водоемов Северного Причерноморья / Л. А. Журавлева // Гидробиология Дуная и лиманов Северо-Западного Причерноморья. – К. : Наук. думка, 1986. – С. 19–35.
6. Журавлева Л. А. Гидрохимический режим / Л. А. Журавлева, Н. Г. Александрова // Лиманы Северного Причерноморья. – Киев : Наук. думка, 1990. – С. 29–69.
7. Шекк П. В. Формування іхтіофауни Хаджибейського лиману / П. В. Шекк, М. І. Крюкова // Таврійський науковий вісник. – Херсон, 2012. – Вип. 78. – С. 315–319.
8. Правдин И. Ф. Руководство по изучению рыб / И. Ф. Правдин. – М. : Пищевая промышленность, 1966. – 376 с.
9. Световидов А. Н. Рыбы Черного моря / А. Н. Световидов. – М. ; Л. : Наука, 1964. – 551 с.
10. Мэйтленд П. С. Определитель пресноводных видов Европы : атлас рыб / П. С. Мэйтленд, К. Линсел, В. Сиделева. – СПб. : Амфора, 2009. – 287 с.
11. Мовчан М. Ю. Риби України / М. Ю. Мовчан. – К. : Золоті ворота, 2011. – 420 с.
12. Замриборщ Ф. С. Рыбы низовьев рек и приморских водоемов северо-западной части Черного моря и условия их существования : автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Ф. С. Замриборщ. – Одесса, 1965. – 65 с.
13. Замриборщ Ф. С. Опыт промыслового выращивания кефали в Хаджибейском лимане / Ф. С. Замриборщ // Рыбное хозяйство. – 1952. – № 4. – С. 45–46.
14. Шекк П. В. Опыт контролируемого товарного выращивания кефалей во внутренних водоемах северо-западного Причерноморья / П. В. Шекк, В. П. Бондарь, В. А. Малаховский // Рыбное хозяйство. – 1998. – № 4. – С. 68–74.
15. Шекк П. В. Екологічні аспекти інтродукції далекохідної кефалі піленгасу MUGIL SO-IUY (BASILEWSKY) у лимані північно-західного Причорномор'я / П. В. Шекк // Зб. наук. праць Полтав. держ. пед. ун-ту. – Полтава, 2007. – Вип. 6 (58). Серія : Екологія, біологічні науки. – С. 109–115.
16. Шекк П. В. Биологически-технологические основы культивирования кефалевых и камбаловых рыб / П. В. Шекк. – Херсон : ЧП Гринь, 2012. – 305 с.

Шекк Павел. Изменение видового состава ихтиофауны Хаджибейского лимана под действием антропогенных факторов и пути её целенаправленного формирования. Хаджибейский лиман – высокопродуктивный водоём северо-западного Причерноморья. Под влиянием антропогенных факторов водоём последовательно превращался из полигалинного в мезогалинный – олигогалинный – пресноводный и вновь в олигогалинный. Состав ихтиофауны и рыбопродуктивность лимана неоднократно изменялись в зависимости от гидролого-гидрохимического режима водоема, в первую очередь от солености вод. За последние 34 года в лимане встречалось до 21 вида рыб. Многие из них (калкан, угорь, осетр, густера, сом, глосса и др.) попали в лиман случайно либо в результате ограниченной интродукции и встречались редко, иногда единично.

В настоящее время лиман представляет собой солоноватоводный водоём-накопитель, что предполагает возможность целенаправленного формирования видового состава ихтиофауны.

Ключевые слова: Хаджибейский лиман, гидролого-гидрохимический режим, состав ихтиофауны, целенаправленное формирование.

Shekk Pavel. Changes in Species Composition of Fish Fauna Hadzibeevsky Estuary Under the Influence of Anthropogenic Factors and Ways of its Purposeful Formation. Hadzibeevsky estuary highly productive reservoir north-west of the Black Sea. Under the influence of anthropogenic factors reservoir experienced a number of periods of consistently turning in poligalinnogo mesohaline - oligogaliny – freshwater and again in oligagalinnny. The composition of the fish fauna and fish productivity Hadzibeevsky estuary repeatedly changed depending on the hydrological and hydrochemical regime of the water body and primarily on salinity. Over the last 34 years, in the estuary occurred up to 21 species of fish. Many of them (turbot, eel, sturgeon, bream, catfish, flounder, etc.). Got into the estuary by accident or as a result of the introduction of a limited and rare, sometimes singly and in limited quantities.

At present, the estuary is a brackish body of water storage, which implies the possibility of purposeful formation of the species composition of the fish fauna. Promising targets cultivation Khadzhibey estuary include: flounder, sturgeon, salmon, gobies, shrimp. Important area of aquaculture in the estuary - artificial reefs.

Keywords: Khadzhibei estuary, hydrological and hydrochemical conditions, the composition of the fish fauna, purposeful formation.

Стаття надійшла до редколегії
16.02.2015 р.

